


Regard santé

l'aire de Méru



→ Présentation de l'aire

L'aire de Méru comprend un seul canton éponyme.
Au 1^{er} janvier 2006, on dénombrait **30 946 habitants**, soit une densité de 181,6 habitants au km². Cette densité est plus importante que celles du département (135,3 h/km²), de la région (97,6 h/km²) et du pays (112,9 h/km²).

La proportion de **moins de 25 ans** en 1999 est supérieure dans l'aire de Méru à celle des trois entités géographiques de référence : 37,4 % contre 34,0 % dans l'Oise, 33,1 % en Picardie et 30,9 % en France métropolitaine.


Parallèlement, les personnes de **75 ans et plus** sont moins nombreuses dans l'aire de Méru (4,4 %) que dans le département (5,5 %), qu'en région (6,6 %) et qu'au niveau national (7,7 %).

Avec 2,14 enfants par femme, l'**indice conjoncturel de fécondité** de l'aire de Méru dépasse sensiblement ceux de l'Oise (2,07), de la Picardie (2,00) et de la France métropolitaine (1,90).

La proportion de naissances dont la **mère est mineure** est de 6,2 ‰ dans l'aire, ce qui se situe en dessous des niveaux départemental (7,6 ‰) et régional (9,6 ‰), mais demeure au-dessus du niveau national (5,6 ‰). Cela représente 11 des 1 767 naissances domiciliées dans l'aire entre 2003 et 2006.

Entre 2001 et 2004, sur les 1 713 naissances domiciliées dans l'aire de Méru, 5,1 % ont eu lieu dans l'aire de Méru, 44,2 % dans le canton de Beaumont-sur-Oise, 16,6 % dans celui de l'Isle-Adam, 12,3 % dans celui de Beauvais, 11,6 % dans celui de Pontoise et 10,2 % ailleurs en France.

Sur la même période, il y a eu 1 746 décès d'habitants de l'aire. Parmi eux, 41,4 % ont eu lieu dans l'aire de Méru, 16,7 % dans le canton de Pontoise, 11,5 % dans le canton de Beauvais, 11,0 % dans celui de Beaumont-sur-Oise et 19,4 % dans le reste de la France.



Sources : Insee, OR2S

SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



Assurance
Maladie

Service Médical
Nord-Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales

Moins de chômeurs de longue durée, de Rmistes et de bénéficiaires de la CMU

Le **revenu moyen imposable** dans l'aire de Méru est de 16 521 €, ce qui est inférieur aux revenus moyens de l'Oise (17 447 €) et de la France métropolitaine (17 165 €), mais demeure supérieur à celui de la Picardie (15 938 €).

La part de foyers **non imposables** dans l'aire (41,8 %) est en-dessous des trois niveaux géographiques de comparaison (42,5 % dans l'Oise, 47,8 % en Picardie et 46,2 % en France métropolitaine).

En 2004, le taux de bénéficiaires de l'**aide ménagère** est de 29,7 pour 1 000 personnes de 65 ans et plus dans l'aire de Méru, soit plus que les taux isarien (20,7 ‰) et picard (21,3 ‰).

En 2005, le taux de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA) à domicile est de 70,2 pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, soit moins que dans l'Oise (72,7 ‰), qu'en Picardie (117,7 ‰) et qu'en France métropolitaine (149,4 ‰).

En 2004, on dénombre 1 435 **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) de catégorie 1 dans l'aire de Méru.

Parmi eux, le pourcentage de personnes de moins de 25 ans est de 21,4 %, ce qui est moins élevé qu'aux niveaux départemental (23,5 %) et régional (24,8 %).

Inversement, le taux de chômeurs de 50 ans et plus dans l'aire (14,6 %) est proche de celui de l'Oise (14,3 %) et plus élevé qu'en Picardie (13,6 %).


La proportion de chômeurs de longue durée (DEFM depuis un an ou plus) est également proche de l'aire de Méru (30,2 %) et de l'Oise (30,6 %) et plus fort qu'en Picardie (33,9 %).

En 2004, on dénombre dans l'aire de Méru 349 allocataires du **revenu minimum d'insertion** (RMI). Le taux d'allocataires du RMI est de 34,3 bénéficiaires pour 1 000 ménages dans l'aire, soit un taux inférieur à ceux de l'Oise (36,8 ‰), de la Picardie (42,3 ‰) et de la France métropolitaine (41,9 ‰).


De la même manière, le taux de Rmistes parmi les familles monoparentales est inférieur dans l'aire à ceux du département et de la région : 96,9 ‰ contre respectivement 116,9 ‰ et 133,4 ‰.

Concernant les couples, le taux de Rmistes est de 8,0 pour 1 000 couples, soit moins que dans l'Oise (11,2 ‰) et qu'en Picardie (14,5 ‰).

Le taux de Rmistes de 25-49 ans parmi les personnes du même âge reste également en-dessous des taux départemental et régional : 24,1 ‰ contre 26,6 ‰ et 33,4 ‰.



Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee, OR2S



Sources : Cpam, MSA, RSI, Insee, OR2S

L'aire de Méru compte 329 bénéficiaires de la **couverture maladie universelle (CMU) de base**, soit un taux de 10,4 pour 1 000 habitants. Ce taux est plus faible que les taux isarien (13,6 ‰), picard (16,1 ‰) et national (22,1 ‰).

De la même façon, le taux de bénéficiaires de la **CMU complémentaire** dans l'aire (64,6 ‰) se situe en-dessous des taux de l'Oise (70,7 ‰), de la Picardie (89,6 ‰) et de la France métropolitaine (67,5 ‰). Ceci représente 2 045 personnes.

→ Professionnels de santé

Des professionnels de santé moins nombreux et plus âgés

En novembre 2006, on dénombre 24 **médecins généralistes** dans l'aire de Méru, soit une densité de 7,5 pour 10 000 habitants. Cette densité est inférieure à celles des trois zones géographiques de référence : 8,6 dans l'Oise, 9,7 en Picardie et 11,2 en France métropolitaine.

Les femmes représentent 37,5 % de ces médecins généralistes, soit sensiblement plus que dans le département (30,5 %), qu'en région (27,6 %) et qu'au niveau national (29,4 %).

L'âge moyen des médecins généralistes de l'aire est de 51,9 ans, soit plus que dans l'Oise (49,6 ans), qu'en Picardie (49,4 ans) et qu'en France métropolitaine (49,8 ans). Par ailleurs, un tiers de ces médecins a 55 ans ou plus (33,3 % contre 31,6 % dans l'Oise, 31,5 % en Picardie et 32,3 % en France métropolitaine).

On recense 11 **médecins spécialistes** dans l'aire de Méru, soit une densité de 3,4 pour 10 000 habitants en novembre 2006, ce qui est également inférieur aux densités de l'Oise (5,2), de la Picardie (5,2) et de la France métropolitaine (8,8).

Les femmes représentent 18,2 % des médecins spécialistes (29,4 % dans le département, 26,6 % dans la région et 32,7 % au niveau national). L'âge moyen des spécialistes de l'aire est de 54,5 ans soit 1,7 an de plus que la moyenne isarienne et 2,5 ans de plus que les moyennes picarde et française. Le pourcentage de médecins spécialistes de 55 ans ou plus (63,6 %) est sensiblement supérieur à ceux de l'Oise (41,0 %), de la Picardie (37,1 %) et de la France métropolitaine (39,3 %).

Au 31 décembre 2007, on compte 7 **dentistes** dans l'aire de Méru, soit une densité de 2,2 chirurgiens-dentistes pour 10 000 habitants. Cette densité est inférieure à celles de l'Oise (4,0), de la Picardie (4,0) et de la France métropolitaine (6,2).

Les femmes représentent 28,6 % des dentistes de l'aire, soit un pourcentage proche de ceux du département (28,4 %) et de la région (29,2 %) et plus faible qu'au niveau national (33,9 %). L'âge moyen des dentistes est de 49,1 ans dans l'aire contre 48,4 ans dans l'Oise, 48,2 ans en Picardie et 47,8 ans en France métropolitaine. Parmi ces 7 dentistes, deux ont 55 ans ou plus.



En avril 2007, 30 **auxiliaires médicaux** exercent dans l'aire de Méru, soit une densité de 9,3 pour 10 000 habitants, ce qui est plus inférieur aux densités du département (11,8), de la région (13,8) et du niveau national (21,9).

Parmi eux, 70,0 % sont des femmes (69,7 % dans l'Oise, 71,0 % en Picardie et 69,0 % en France métropolitaine). L'âge moyen de ces auxiliaires médicaux est de 44,7 ans dans l'aire, soit 1,2 an de plus que dans l'Oise, 1,3 an de plus qu'en Picardie et 1,1 an de plus qu'en France métropolitaine. Un peu plus d'un quart des auxiliaires médicaux ont 55 ans ou plus (26,7 %), ce qui est sensiblement supérieur au département (16,9 %), à la région (19,1 %) et au niveau national (18,3 %).

On compte 17 **infirmiers libéraux** exerçant dans l'aire de Méru, soit une densité de 5,3 pour 10 000 habitants. Cette densité est proche de celle de l'Oise (5,5) et inférieure à celles de la Picardie (7,1) et de la France métropolitaine (11,2).

Les femmes représentent 94,1 % des infirmiers libéraux contre 87,9 % dans le département, 88,5 % en région et 84,6 % au niveau national. L'âge moyen des infirmiers libéraux est de 42,6 ans, ce qui est moins élevé que dans les zones géographiques de référence (44,1 ans dans l'Oise, 44,6 ans en Picardie et 44,9 ans en France métropolitaine).

En 2004, on recense 9 **pharmacies** dans l'aire de Méru, soit une densité de 2,9 pour 10 000 habitants, proche de celles de l'Oise (3,1) et de la Picardie (3,3).



Sources : Adeli, Insee, OR2S

Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, les habitants de l'aire de Méru ont consulté un médecin généraliste de l'aire dans 74,2 % des cas. Dans 3,7 % des cas les consultations ont eu lieu dans le canton de Neuilly-en-Thelle.

Les consultations d'ophtalmologie ont suscité de plus nombreuses migrations. Ainsi, 55,9 % de ces consultations se sont déroulées dans l'aire de Méru et 9,1 % dans le canton de Cergy et 7,9 % dans celui de Beauvais.

Pour les consultations de gynécologie médicale, les consultations se sont déroulées à 12,9 % dans le canton de Beauvais, à 10,8 % dans celui de Pontoise et à 8,0 % dans celui de Cergy.


Même constat pour les consultations de gynéco-obstétrique qui donnent lieu à de nombreuses migrations et qui ont eu lieu à 5,7 % dans l'aire de Méru, à 24,8 % dans le canton de l'Isle-Adam, à 17,5 % dans celui de Beaumont-sur-Oise et à 12,7 % dans celui de Beauvais.

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale plus élevée, plus d'admissions en ALD mais moins d'hospitalisations

L'**espérance de vie** à la naissance des hommes de l'aire de Méru est de 74,4 ans, soit une espérance de vie proche de celles de l'Oise (74,8 ans) et de la Picardie (74,1 ans) et inférieure à celle de la France métropolitaine (75,9 ans).

Pour les femmes de l'aire, l'espérance de vie est de 81,0 ans, ce qui est inférieur à celles des trois zones géographiques de référence (82,0 ans dans l'Oise, 81,7 ans en Picardie et 83,2 ans en France métropolitaine).



Le taux de **mortalité générale** de l'aire Méru est de 1 091,0 pour 100 000 habitants en 2000-2004, ce qui situe l'aire au-dessus des taux isarien (1 014,9), picard (1 052,7) et national (911,3). Ceci représente 213 décès en moyenne par an dans l'aire.

Le taux de **mortalité prématurée** (qui concerne les décès survenant avant l'âge de 65 ans) est de 247,4 pour 100 000 dans l'aire en 2000-2004, soit plus que les taux isarien et national (respectivement 243,2 et 221,5) mais moins que le taux picard (262,7).

La première cause de décès chez les femmes de l'aire est représentée par les **maladies de l'appareil circulatoire** (28,7 % des décès), suivies des **tumeurs malignes** (22,6 % des décès). La troisième cause de décès féminins dans l'aire de Méru est constituée des **causes externes de mortalité**, comprenant notamment les accidents de la voie publique et les suicides (7,4 % des décès).

Concernant les hommes de l'aire de Méru, les tumeurs malignes constituent la première cause de décès (31,8 % des décès), devant les maladies de l'appareil circulatoire (26,0 % des décès) et les causes externes de mortalité (8,9 % des décès).

Le taux de mortalité par **suicide** dans l'aire de Méru est de 16,5 décès pour 100 000 habitants en 2000-2004, ce qui est inférieur aux taux de l'Oise (20,6), de la Picardie (23,1) et de la France métropolitaine (18,0).

Le taux de mortalité par **accidents de la circulation** est également inférieur dans l'aire (11,4) aux taux isarien (14,7) et picard (14,3) mais proche du taux français (10,8).

Le taux de **séjours hospitaliers** dans l'aire de Méru est de 271,5 pour 1 000, soit 7 650 séjours à l'hôpital d'habitants de l'aire en moyenne par an en 2004-2005. Ce taux est plus faible que ceux de l'Oise (299,9 ‰) et de la Picardie (289,3 ‰).

En 2004-2005, 504 **nouvelles admissions en ALD** par an sont enregistrées dans l'aire de Méru, dont 53,7 % pour des hommes.

Les deux premières causes d'admissions en ALD chez les hommes sont les tumeurs malignes (59 hommes) et le diabète (46 hommes) dans l'aire de Méru. Chez les femmes, ce sont les tumeurs malignes (56 femmes) et l'hypertension artérielle sévère (42 femmes).

Le taux d'admissions en ALD pour diabète est de 321,9 pour 100 000 en 2004-2005 dans l'aire de Méru, contre 308,2 dans l'Oise, 311,4 en Picardie et 266,5 en France métropolitaine.

Le diabète compliqué induit à terme des affections neurologiques, ophtalmologiques, rénales ou cardiovasculaires. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeur maligne	56	24,1	1	59	21,9	1
Hypertension artérielle sévère	42	18,1	2	38	14,0	3
Diabète	37	15,7	3	46	16,8	2
Affections psychiatriques de longue durée	15	6,4	4	16	5,8	6
Pathologie cardiaque grave	15	6,4	5	21	7,6	5
Maladie coronaire	10	4,4	6	31	11,4	4
Maladie d'Alzheimer et autres démences	10	4,1	7	3	1,2	13
Artériopathies chroniques	8	3,5	8	13	4,7	7
Insuffisance respiratoire chronique	6	2,5	9	9	3,2	8
Accident vasculaire cérébral	5	2,3	10	7	2,6	10
Formes graves des affections neurologiques	3	1,4	13	7	2,7	9
Autres causes de nouvelles admissions	25	10,9	-	22	8,2	-
Total	233	100		271	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Des admissions en ALD, des hospitalisations et une mortalité par maladies cardiovasculaires au-dessus des références

Les **maladies de l'appareil circulatoire** comprennent l'hypertension artérielle (HTA), les pathologies cardiaques graves, la maladie coronaire, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et l'artériopathie chronique. En 2004-2005, 190 habitants de l'aire de Méru ont été admis annuellement en ALD pour maladie cardiovasculaire (81 femmes et 109 hommes). Le taux d'admissions en ALD de l'aire pour ces pathologies (835,5 pour 100 000 en 2004-2005) dépasse ceux des entités géographiques de référence (638,7 dans l'Oise, 602,0 en Picardie et 586,1 en France métropolitaine) et est le plus élevé des aires picardes.

Le taux de séjours hospitaliers pour maladies de l'appareil circulatoire est supérieur dans l'aire aux taux départemental et régional (respectivement 29,2 pour 1 000 en 2004-2005 contre 27,3 ‰ et 27,8 ‰), soit 684 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an.

De même, le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire est plus élevé dans l'aire de Méru (322,6 pour 100 000 en 2000-2004) que dans l'Oise (297,8), qu'en Picardie (314,2) et qu'en France métropolitaine (271,8).


Le taux de séjours hospitaliers pour **cardiopathie ischémique** est de 7,1 pour 1 000 dans l'aire de Méru en 2004-2005, ce qui est supérieur aux taux départemental (6,0 ‰) et régional (6,1 ‰). Ceci correspond à 168 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an (130 hommes et 38 femmes).

Le taux de mortalité pour cette pathologie est également supérieur dans l'aire (102,8) à l'Oise (82,5), à la Picardie (86,6) et à la France métropolitaine (74,6).

Le taux d'admissions en ALD pour **accident vasculaire cérébral** (AVC) de l'aire de Méru est de 57,3 pour 100 000 en 2004-2005 (soit 12 personnes en moyenne par an), ce qui est proche des taux isarien (57,4) et picard (56,1) et légèrement en-dessous du taux national (60,5).

En 2004-2005, le taux de séjours hospitaliers pour AVC de l'aire de Méru est de 2,4 ‰ (55 hospitalisations d'habitants de l'aire en moyenne par an), ce qui est en-dessous du taux départemental (3,3 ‰) et proche du taux régional (2,8 ‰).

Le taux de mortalité par AVC est également plus bas dans l'aire de Méru (59,8 pour 100 000 en 2000-2004) que dans l'Oise (67,5), qu'en Picardie (69,6) et qu'en France métropolitaine (63,4).



Le taux d'admissions en ALD pour **pathologies cardiaques graves** est de 173,9 pour 100 000 dans l'aire de Méru en 2004-2005 (36 admissions par an : 15 femmes et 21 hommes). Ce taux est sensiblement supérieur à ceux de l'Oise (153,1), de la Picardie (149,7) et de la France métropolitaine (140,1).

Le nombre de nouvelles admissions en ALD pour **maladie coronaire** dans l'aire est de 41 par an (10 femmes et 31 hommes), soit un taux de 173,5 pour 100 000 supérieur aux moyennes isarienne (147,1), picarde (150,0) et nationale (140,8).

Le taux d'admissions en ALD pour **hypertension artérielle sévère** dans l'aire est de 338,0 pour 100 000 en 2004-2005, ce qui est supérieur aux taux isarien, picard et français (respectivement 203,9, 164,4 et 170,2). Il s'agit par ailleurs du taux le plus élevé des aires picardes. En 2004-2005, cela représente 80 nouveaux admis en ALD en moyenne par an dans l'aire (42 femmes et 38 hommes).

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Moins de cancers de la prostate, du sein et du poumon, mais davantage de cancers des voies aérodigestives supérieures

Le taux d'admissions en ALD pour **tumeurs malignes** de l'aire de Méru est de 494,6 pour 100 000 (soit 115 admissions en moyenne par an dans l'aire de Méru en 2004-2005 : 59 hommes et 56 femmes). Ce taux est supérieur à ceux observés dans l'Oise (482,4) et en France métropolitaine (483,1), mais est proche de la Picardie (497,8).

Le taux de séjours hospitaliers pour l'ensemble des tumeurs est de 23,0 pour 1 000 dans l'aire, soit un peu moins que dans l'Oise (26,9 ‰) et qu'en Picardie (24,3 ‰). En 2004-2005, 586 séjours pour tumeurs malignes ont été enregistrés en moyenne par an pour des habitants de l'aire de Méru (364 hommes et 222 femmes).

Le taux de mortalité pour l'ensemble des tumeurs est moins élevé dans l'aire que dans le département et qu'en région (270,1 pour 100 000 contre respectivement 278,7 et 286,6), mais demeure plus élevé que le taux national (257,8).




Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

Le taux d'admissions en ALD pour **cancer de la prostate** des hommes de l'aire de Méru est de 186,7 pour 100 000 en 2004-2005 (15 hommes en moyenne par an, dont 11 de 65 ans et plus), ce qui est plus bas que dans les zones géographiques de référence (203,9 dans l'Oise, 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine). Après 65 ans, ce taux est par contre plus élevé dans l'aire (989,9) que dans le département (963,1), qu'en région (969,5) et qu'au niveau national (915,3).

Le taux de séjours hospitaliers d'habitants de l'aire de Méru pour cancer de la prostate (3,9 pour 1 000, soit 35 hommes en moyenne par an entre 2004 et 2005) est identique aux taux départemental et régional (3,9 ‰ pour l'Oise et la Picardie).

Enfin, le taux de mortalité pour cancer de la prostate est moins élevé dans l'aire de Méru (42,8 pour 100 000 en 2000-2004) que dans l'Oise (50,2), qu'en Picardie (53,8) et qu'en France métropolitaine (45,1). Ceci se retrouve après 65 ans : 232,4 pour 100 000 dans l'aire contre 289,8 dans le département, 312,9 en région et 262,1 au niveau national.




Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

Concernant le **cancer du sein**, le taux d'admissions en ALD dans l'aire de Méru est inférieur à ceux des entités géographiques de référence : 158,8 contre 169,8 dans l'Oise, 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine. Ceci représente 23 femmes admises en ALD en moyenne par an dans l'aire, dont 20 de moins de 65 ans.

En 2004-2005, 47 séjours hospitaliers d'habitantes de l'aire pour cancer du sein ont été enregistrés par an, soit un taux de 3,2 pour 1 000. Ce taux est moins élevé que dans l'Oise et qu'en Picardie (4,9 ‰ et 4,4 ‰ respectivement).

Le taux de mortalité par cancer du sein dans l'aire de Méru est également moins élevé que dans le département et qu'en région (35,0 pour 100 000 contre 36,6 et 37,3 respectivement), mais est supérieur au taux national (33,2).

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

En 2004-2005, 12 nouvelles admissions en ALD pour **cancer du côlon-rectum** ont été enregistrées en moyenne par an dans l'aire de Méru (5 femmes et 7 hommes). Le taux d'admissions en ALD pour cette pathologie est de 54,0 pour 100 000, ce qui est supérieur aux taux de l'Oise (45,8), de la Picardie (46,8) et de la France métropolitaine (48,4).

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer colorectal dans l'aire est proche des taux départemental et régional : 2,1 pour 1 000 dans l'aire en 2004-2005 (45 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an), contre 2,5 % dans l'Oise et 2,3 % en Picardie.

La mortalité par cancer du côlon-rectum de l'aire (22,6 pour 100 000 en 2000-2004) est à l'inverse inférieure à celles du département (26,1), de la région (28,9) et du pays (27,8).

En 2004-2005, 40 séjours hospitaliers ont été enregistrés en moyenne par an pour un **cancer des voies aérodigestives supérieures** (VADS) pour des habitants de l'aire de Méru (36 hommes et 4 femmes), soit un taux de d'hospitalisations de 1,5 pour 1 000. Ce taux est identique aux taux isarien et picard (1,5 ‰ pour chaque).

La mortalité par cancer des VADS dans l'aire est de 32,0 pour 100 000 en 2000-2004, ce qui est sensiblement supérieur aux taux observés dans l'Oise (20,3), en Picardie (22,2) et en France métropolitaine (17,3).

Le taux de séjours hospitaliers de l'aire de Méru pour **cancer de la trachée, des bronches et du poumon** est de 2,9 ‰ en 2004-2005, ce qui est proche du taux picard (2,8 ‰), et un peu moins élevé que le taux isarien (3,3 ‰). Ceci représente 75 séjours annuels moyens pour des habitants de l'aire (65 hommes et 10 femmes).

Le taux de mortalité de l'aire par cancer de la trachée, des bronches et du poumon est par contre moins élevé dans l'aire que dans les zones géographiques de référence : 42,0 à Méru contre 49,0 dans l'Oise, 50,0 en Picardie et 44,0 en France métropolitaine.

→ Asthme

En 2006, 2 347 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (1 205 femmes et 1 142 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit 9,4 % **des assurés** de l'aire de Méru. Ce taux est proche de celui de l'Oise (9,5 %) et inférieur à celui de la Picardie (10,3 %). Les femmes et les hommes ont des taux proches (9,4 % et 9,5 %).

Les 0-12 ans sont 11,5 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Méru, soit 591 jeunes en 2006. Ce taux est proche des taux départemental (11,5 %) et régional (12,0 %). Les garçons de l'aire sont davantage concernés que les filles : 13,5 % d'entre eux ont reçu un traitement (13,3 % dans le département et 13,9 % en région) *versus* 9,4 % des filles (respectivement 9,7 % et 10,1 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques


Des admissions en ALD pour affection psychiatrique de longue durée et maladie d'Alzheimer moins élevées

En 2004-2005, 31 nouvelles admissions en ALD pour **affections psychiatriques de longue durée** ont été enregistrées dans l'aire de Méru (16 hommes et 15 femmes), soit un taux de 101,2 pour 100 000 qui situe l'aire sous les taux de l'Oise (139,6), de la Picardie (131,9) et de la France métropolitaine (169,8).


Le taux de séjours hospitaliers de l'aire pour troubles mentaux et comportementaux est également plus faible dans l'aire que dans le département et qu'en région (6,2 pour 1 000 contre respectivement 10,4 ‰ et 7,5 ‰). Ceci représente 168 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an en 2004-2005 (autant d'hommes que de femmes).

En 2004-2005, 13 admissions en ALD pour **maladie d'Alzheimer** et autres démences ont été réalisées par an dans l'aire de Méru (3 hommes et 10 femmes).

Le taux d'admissions en ALD s'y rapportant est également inférieur dans l'aire aux taux départemental, régional et national : 78,2 pour 100 000 en 2004-2005 contre respectivement 91,7, 89,5 et 86,2.



En 2006, 34 personnes de 70 ans et plus du régime général de l'aire de Méru ont reçu un **traitement anti-Alzheimer** (11 hommes et 23 femmes), soit 1,8 % des 70 ans et plus de l'aire. Cette proportion est inférieure à celles de l'Oise (2,6 %) et de la Picardie (2,8 %). Les femmes sont plus nombreuses à avoir été remboursées que les hommes : 1,9 % des femmes de 70 ans et plus (2,9 % des Isariennes et 3,2 % des Picardes) contre 1,5 % des hommes (2,0 % des Isariens et 2,1 % des Picards).



En 2006, 4 417 assurés du régime général de l'aire de Méru ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope**, soit 20,5 % des assurés de l'aire (25,8 % des femmes et 14,9 % des hommes). Cette proportion est inférieure à celles du département (22,1 %) et de la région (24,1 %).

Les psychotropes les plus remboursés sont les **anxiolytiques**. En 2006, 3 082 assurés de l'aire ont été remboursés au moins une fois pour un anxiolytique, soit 14,2 % des assurés de l'aire (18,4 % des femmes et 9,7 % des hommes), ce qui est également moins élevé que dans l'Oise (15,0 %) et qu'en Picardie (16,4 %).

Les **antidépresseurs** ont été remboursés à 1 517 habitants de l'aire, soit 6,9 % des assurés de Méru (9,6 % des femmes et 3,8 % des hommes). Ceci est moins élevé que dans l'Oise (7,7 %) et qu'en Picardie (8,3 %).

En 2006, 264 assurés ont été remboursés au moins une fois pour des **neuroleptiques**, soit 1,3 % des assurés de Méru (1,2 % des hommes et 1,3 % des femmes). Ce taux est proche des taux isarien et picard (respectivement 1,5 % et 1,6 %).

Enfin, les **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), les produits de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et les **traitements de la dépendance à l'alcool** ont été remboursés à moins de 1 % des assurés de l'aire de Méru : respectivement 0,2 % (41 personnes), 0,1 % (29 personnes) et 0,3 % (76 personnes).


Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).

→ Prévention

Un taux de dépistage du cancer du sein faible


Durant la campagne de **dépistage organisé du cancer du sein** de 2005-2006, 1 522 mammographies ont été réalisées auprès de femmes de 50-74 ans, soit un taux de dépistage de 42,2 %. Ce taux est moins important que dans les zones géographiques de référence : 43,8 % dans l'Oise, 45,5 % en Picardie et 47,1 % en France entière.

En 2006, 1 586 **frottis** ont été effectués auprès de femmes de 25-64 ans de l'aire, soit 22,8 % des femmes de cette tranche d'âge. Ce pourcentage est plus faible que celui du département (24,2 %) mais plus élevé que celui de la région (20,8 %).



En 2000-2003, 10,2 % des femmes de l'aire de Méru ayant accouché ont eu **moins de 7 consultations prénatales**, soit autant que dans l'Oise (10,7 %) et moins qu'en Picardie (15,7 %).

Le taux de **prématurés** est par contre plus élevé dans l'aire que dans le département et la région : 6,9 % contre respectivement 5,3 % et 5,6 %.



En 2006, 59,8 % des habitants de l'aire de Méru de 65 ans et plus ont été **vaccinés contre la grippe**, ce qui est moins élevé que dans l'Oise (62,3 %) et qu'en Picardie (64,9 %).

Les femmes de l'aire ont un taux de vaccination proche de celui des hommes : 60,1 % des femmes (62,2 % des Isariennes et 64,2 % des Picardes) et 59,3 % des hommes (62,6 % des Isariens et 66,1 % des Picards).

De la même manière, le pourcentage d'habitants de l'aire de moins de 65 ans en ALD vaccinés contre la grippe est inférieur dans l'aire aux pourcentages de l'Oise et de Picardie : 37,9 % contre respectivement 41,1 % et 46,7 %.

En 2006, 38,3 % des femmes de l'aire de Méru de moins de 65 ans en ALD sont vaccinées (41,7 % dans le département et 47,6 % en région) et 37,7 % des hommes (40,6 % dans l'Oise et 46,1 % en Picardie).

En 2006, 91,9 % des enfants de 2 ans de l'aire de Méru sont vaccinés contre la **diphtérie, le tétanos et la poliomyélite**, ce qui est proche des taux de l'Oise et de la Picardie (91,7 % et 91,3 %).

Cette même année, 89,5 % des enfants de 2 ans sont vaccinés contre la **rougeole, les oreillons et la rubéole**, ce qui est inférieur au département (91,3 %) et proche de la région (89,2 %).


Plus de huit enfants sur dix de l'aire (87,6 %) ont eu le vaccin **BCG** (87,4 % dans le département et 84,6 % en région).

Le vaccin contre l'**hépatite B** a une couverture vaccinale de 49,5 % des enfants de 2 ans de l'aire en 2006 contre 51,5 % dans l'Oise et 52,7 % en Picardie.

Seul un quart des enfants de 12 ans de l'aire (25,3 %, soit 152 enfants) ont **consulté un dentiste, un stomatologue et/ou un chirurgien-dentiste** entre le 1^{er} août 2005 et 31 juillet 2007. Ce taux est inférieur aux taux isarien et picard (33,7 % et 36,9 %).

Par ailleurs, 20,3 % des enfants de 12 ans de l'aire ont subi une intervention (24,7 % dans l'Oise et 27,4 % en Picardie) : 48 enfants qui ont bénéficié de soins conservateurs, 40 de soins de chirurgie et 76 de soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires




Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S

Les revenus moyens de l'aire de Méru sont équivalents à ceux de la Picardie (rapport de 1,0), tandis que les taux de chômage de longue durée, de Rmistés et d'allocataires de l'APA à domicile sont moins élevés dans l'aire de Méru que dans la région (rapports respectifs de 0,9 ; 0,8 et 0,6).

La densité de logements sociaux et le taux de bénéficiaires de l'aide ménagère sont par contre plus importants dans l'aire qu'en Picardie (rapports de 1,1 et 1,4).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie. La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

On observe une surmortalité générale de 20 % dans l'aire de Méru par rapport au niveau national (rapport de 1,2).

Le taux global d'admissions en ALD est également plus important dans l'aire qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (rapports de 1,1).

Le taux d'admissions en ALD pour pathologies cardiovasculaires est plus élevé de 40 % par rapport aux niveaux régional et national (rapports de 1,4), tandis que la mortalité pour ces pathologies est supérieure de 20 % par rapport au niveau national (rapport de 1,2) et équivalente au niveau régional (1,0).

Enfin, l'aire de Méru est proche des niveaux régional et national en ce qui concerne la mortalité et le taux d'admissions en ALD pour tumeurs malignes.

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Concernant la prévention dans l'aire de Méru, la proportion de frottis réalisés est plus importante dans l'aire qu'en région (rapport de 1,1).

La vaccination des enfants de 2 ans contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ROR est quant à elle équivalente entre l'aire et la région (rapport de 1,0).

Concernant les taux de dépistage du cancer du sein (0,9), la vaccination anti-grippale chez les personnes de 65 ans et plus (0,9) et le suivi dentaire des enfants de 12 ans (consultations ou soins, rapports de 0,7), les taux sont plus faibles dans l'aire de Méru qu'en Picardie.



→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

L'aire de Méru présente des revenus moyens peu élevés mais moins de chômeurs de longue durée et de Rmistes que dans les zones géographiques de référence. L'aire présente également un plus faible taux de bénéficiaires de la couverture maladie universelle.

La densité de professionnels de santé (médecins généralistes, spécialistes, dentistes, auxiliaires médicaux et infirmiers) est plus faible que dans les zones de référence. Ces professionnels sont également en moyenne plus âgés.

On observe une surmortalité générale par rapport au taux national et des admissions en ALD également plus élevées qu'aux niveaux départemental, régional et national.

Les maladies de l'appareil circulatoire ont des taux d'admissions en ALD et de mortalité plus forts dans l'aire de Méru que dans les entités géographiques de référence, et plus particulièrement pour la mortalité par cardiopathie ischémique et les ALD pour pathologies cardiaques graves, maladies coronaires et hypertension artérielle.

Inversement, les admissions en ALD et la mortalité pour les cancers de la prostate, du sein, du côlon-rectum et de la trachée, des bronches et du poumon sont moins élevés dans l'aire que dans les zones de référence.

Le taux de dépistage du cancer du sein est plus faible que dans l'Oise, qu'en Picardie et qu'en France entière. Par ailleurs, les enfants de 12 ans ont un moins bon suivi dentaire que dans le département et la région.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

L'aire de Méru compte 504 nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD) par an entre 2004 et 2005, soit un taux de 2 101,6 pour 100 000 habitants. Ce taux est supérieur à ceux de l'Oise (1 957,7), de la Picardie (1 946,5) et de la France métropolitaine (1 877,1).

L'espérance de vie à la naissance est de 74,4 ans pour les hommes et de 81,0 ans pour les femmes en 2000-2004.

Mortalité générale

La mortalité générale est plus élevée dans l'aire de Méru que dans les entités géographiques de référence en 2000-2004 : 1 091,0 pour 100 000 dans l'aire contre 1 014,9 dans l'Oise, 1 052,7 en Picardie et 911,3 en France métropolitaine.

La mortalité prématurée (avant 65 ans) est plus forte dans l'aire (247,4) que dans le département (243,2) et qu'au niveau national (221,5) mais moins qu'en région (262,7).

Maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies de l'appareil circulatoire sont responsables de plus d'admissions en ALD (835,5 pour 100 000) et d'une mortalité plus élevée dans l'aire de Méru (322,6 pour 100 000) que dans l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine.

Les admissions en ALD pour pathologies cardiaques graves, hypertension artérielle sévère et maladie coronaire sont plus élevées dans l'aire de Méru que dans les entités géographiques de référence, tout comme la mortalité par cardiopathie ischémique.

À l'inverse, la mortalité par AVC est plus faible dans l'aire (59,8 pour 100 000 en 2000-2004) que dans l'Oise (67,5), qu'en Picardie (69,6) et qu'en France métropolitaine (63,4).

Cancers

Le taux d'admissions en ALD pour cancer de la prostate (186,7 pour 100 000) et pour cancer du sein (158,8), ainsi que les taux de séjours hospitaliers et de mortalité pour ces pathologies sont plus faibles dans l'aire de Méru que dans l'Oise, qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (la mortalité par cancer du sein reste toutefois supérieure au niveau national).

Les mortalités de l'aire par cancer colo-rectal (22,6 pour 100 000) et par cancer de la trachée, des bronches et du poumon (42,0 pour 100 000) sont inférieures à celles du département, de la région et du pays.

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Les affections psychiatriques ont entraîné moins d'admissions en ALD à Méru (101,2 pour 100 000) que dans l'Oise (139,6), qu'en Picardie (131,9) et qu'en France métropolitaine (169,8).

Les admissions en ALD pour maladie d'Alzheimer sont également moins élevées (78,2 pour 100 000 dans l'aire, 91,7 dans le département, 89,5 en région et 86,2 au niveau national).

Le pourcentage d'assurés remboursés au moins une fois pour un psychotrope est plus faible dans l'aire (20,5 %) que dans le département (22,1 %) et qu'en région (24,1 %).

Prévention

Dépistages : le dépistage organisé du cancer du sein est moins élevé dans l'aire (42,2 % des femmes de 50-74 ans) que dans l'Oise (43,8 %), qu'en Picardie (45,5 %) et qu'en France entière (47,1 %). Le pourcentage de frottis réalisés est plus important dans l'aire (22,8 % des femmes de 25-64 ans) qu'en région (20,8 %) mais plus faible que dans le département (24,2 %).

Périnatalité : le taux de femmes ayant accouché en 2000-2003 et ayant eu moins de 7 consultations prénatales dans l'aire de Méru (10,2 %) est proche de l'Oise (10,7 %) et inférieur à la Picardie (15,7 %).

Vaccination : les vaccinations anti-grippales chez les personnes de 65 ans et plus sont moins suivies dans l'aire (59,8 %) que dans le département (62,3 %) et qu'en région (64,9 %). Même situation en ce qui concerne les personnes de moins de 65 ans en ALD (37,9 % vaccinées contre la grippe dans l'aire contre 41,1 % dans l'Oise et 46,7 % en Picardie). Les vaccinations ROR et hépatite B sont moins élevées dans l'aire que dans les zones de référence.

Actes dentaires : le suivi dentaire des enfants de 12 ans est également moins élevé dans l'aire. Seuls 25,3 % ont eu une consultation chez le dentiste (33,7 % dans l'Oise et 36,9 % en Picardie) et seulement 20,3 % ont eu un soin dentaire (24,7 % dans l'Oise et 27,4 % en Picardie).

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en mars 2009
Il a été rédigé et mis en page par Anne Lerat, Anne Ducamp,
Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).