

Regard
santél'aire de **Moreuil**

→ Présentation de l'aire

L'aire de Moreuil située dans le département de la Somme, comprend les deux cantons de Moreuil et Rosières-en-Santerre.

Au 1^{er} janvier 2006, cette aire compte **20 797 habitants**, soit une densité de 66,4 habitants au km². Cette densité est sensiblement plus faible que dans la Somme (91,5 h/km²), qu'en Picardie (97,6 h/km²) et qu'en France métropolitaine (112,9 h/km²).

Cette population compte 7,0 % de **personnes de 75 ans et plus** en 1999 contre 7,3 % dans la Somme, 6,6 % en Picardie et 7,7 % en France métropolitaine.


Les **moins de 25 ans** représentent quant à eux 33,0 % de la population de l'aire, ce qui est proche des proportions relevées dans la Somme (32,7 %) et en Picardie (33,1 %) et légèrement plus élevé qu'en France métropolitaine (30,9 %).

En 2003-2006, l'aire de Moreuil présente un **indice conjoncturel de fécondité** (ICF) de 2,57 enfants par femme, ce qui est plus élevé que dans le département (1,82), qu'en région (2,00) et qu'au niveau national (1,90).

En tout, ce sont 1 153 naissances domiciliées entre 2003 et 2006, dont 11,3 pour 1 000 sont le fait de mères mineures (contre 10,2 % dans la Somme, 9,6 % en Picardie et 5,6 % en France métropolitaine).

Entre 2001 et 2004, les 1 125 naissances dont les parents résident dans l'aire se sont passées à Amiens pour 85,3 % d'entre elles, pour 6,1 % à Péronne et pour 5,7 % à Montdidier.

De même, les décès concernant les habitants de l'aire sont constatés à Boves pour 37,3 % d'entre eux. Amiens, Montdidier et Corbie viennent ensuite avec 35,3 %, 11,9 % et 7,9 % des décès.



SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S

l'Assurance
MaladieService Médical
Nord-Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales

Moins de demandeurs d'emploi de 50 ans et plus et de Rmistes

Un peu plus de la moitié des foyers fiscaux de l'aire est **non imposable** en 2005 (50,9 %), ce qui est proche de la Somme (50,8 %) et supérieur à la Picardie (47,8 %) et à la France métropolitaine (46,2 %).

Les habitants de l'aire ont un **revenu moyen** de 14 905 € en 2005, ce qui est inférieur au département (15 076 €), à la région (15 938 €) et au niveau national (17 165 €).


L'aire de Moreuil compte 29,1 bénéficiaires de l'**aide ménagère** pour 1 000 personnes de 65 ans et plus en 2004, ce qui est supérieur aux moyennes de référence (20,5 ‰ dans la Somme et 21,3 ‰ en Picardie).

L'aire étudiée compte moins de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA) à domicile parmi les 75 ans et plus (99,9 bénéficiaires pour 1 000 personnes de 75 ans et plus en 2005) que la Somme (153,0 ‰), la Picardie (117,7 ‰) et la France métropolitaine (149,4 ‰).

En 2005, l'aire de Moreuil compte 742 **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) de catégorie 1.

Les DEFM de 50 ans et plus représentent 10,8 % des DEFM de l'aire de Moreuil, ce qui est plus faible que dans la Somme (12,0 %) et qu'en Picardie (13,6 %).

En outre, la proportion de DEFM de plus d'un an d'ancienneté est légèrement plus faible : 32,1 % des DEFM de catégorie 1 de l'aire contre 33,2 % dans la Somme et 33,9 % en Picardie.




Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee, OR2S

L'aire compte moins d'allocataires du **revenu minimum d'insertion** (RMI) que les entités géographiques de référence : 36,0 allocataires pour 1 000 ménages en 2004 contre plus de 40 ‰ ailleurs (49,5 ‰ dans la Somme, 42,3 ‰ en Picardie et 41,9 ‰ en France métropolitaine).

Les taux d'allocataires du RMI pour des familles monoparentales ou des couples sont plus bas dans l'aire (respectivement 135,9 pour 1 000 familles monoparentales en 2004 et 13,3 pour 1 000 couples) que dans la Somme (147,2 ‰ et 17,8 ‰) et qu'en Picardie (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

De même, on compte 29,2 Rmistes de 25-49 ans pour 1 000 personnes de la même tranche d'âge dans l'aire contre 41,3 ‰ dans la Somme et 33,4 ‰ en Picardie.



Sources : Cnam, MSA, RSI, Insee, OR2S

La **CMU de base** concerne moins de personnes dans l'aire de Moreuil que dans les entités géographiques de référence : on compte 15,3 bénéficiaires pour 1 000 habitants en 2005 dans l'aire, contre 24,9 ‰ dans la Somme, 16,1 ‰ en Picardie et 22,1 ‰ en France métropolitaine.

Pour la **CMU complémentaire**, l'aire est proche de la moyenne nationale (68,2 pour 1 000 habitants en 2005 contre 67,5 ‰) mais est en dessous de la Somme (105,1 ‰) et de la Picardie (89,6 ‰).

→ Professionnels de santé


Des densités de généralistes et de dentistes faibles

En novembre 2006, l'aire de Moreuil compte 20 **médecins généralistes**, soit une densité de 9,3 généralistes pour 10 000 habitants. Cette densité est proche de celle de la Picardie (9,7) et inférieure à celles de la Somme (12,0) et de la France métropolitaine (11,2).

Parmi les généralistes de l'aire, 25,0 % sont des femmes, ce qui est moins élevé que les proportions départementale (28,6 %), régionale (27,6 %) et nationale (29,4 %).

La moyenne d'âge de ces généralistes est de 48,5 ans, ce qui est inférieur à la Picardie (49,4 ans) et à la France métropolitaine (49,8 ans) et proche de la Somme (48,0 ans).

Cinq d'entre eux ont 55 ans et plus, soit 25,0 % de l'effectif de l'aire (28,8 % dans le département, 31,5 % en région et 32,3 % en métropole).



Sources : Adeli, Insee, OR2S

L'aire ne compte aucun **médecin spécialiste** en novembre 2006. La ville d'Amiens capte une majeure partie des installations de spécialistes et la proximité de l'aire avec cette ville et avec les villes de Montdidier et Roye permet aux habitants d'avoir tout de même recours aux spécialistes.

Au 31 décembre 2007, 4 **chirurgiens dentistes** (dont une femme) sont installés dans l'aire de Moreuil, soit une densité de 1,9 chirurgien dentiste pour 10 000 habitants contre 3,6 dans la Somme, 4,0 en Picardie et 6,2 en France métropolitaine.


La moyenne d'âge des dentistes de l'aire est de 50,0 ans (48,7 ans dans le département, 48,2 ans en région et 47,8 ans au niveau national) et deux d'entre eux ont 55 ans et plus.

Les **auxiliaires médicaux** (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes) sont 38 dans l'aire en avril 2007. La densité est de 17,7 auxiliaires médicaux pour 10 000 habitants, ce qui est plus élevé que dans la Somme (16,0) et qu'en Picardie (13,8) mais plus faible qu'en France métropolitaine (21,9).

Une grande partie des auxiliaires médicaux de l'aire sont des femmes (63,2 %), ce qui est moins important que dans les autres entités géographiques (entre 69 et 72 %). La moyenne d'âge est de 44,0 ans (contre 43,0 ans dans la Somme, 43,4 ans en Picardie et 43,6 ans en France métropolitaine) et 10 auxiliaires médicaux ont 55 ans et plus (soit 26,3 % de l'effectif).

L'aire de Moreuil a une densité de 10,7 **infirmiers** libéraux et mixtes pour 10 000 habitants en avril 2007 (soit 23 infirmiers), ce qui est supérieur au département (8,2) et à la région (7,1) et proche du niveau national (11,2). La grande majorité des infirmiers sont des femmes (73,9 % contre 88,1 % dans la Somme, 88,5 % en Picardie et 84,6 % en France métropolitaine). La moyenne d'âge est de 44,3 ans (contre 45,2 ans dans la Somme, 44,6 ans en région et 44,9 ans au national) et 7 des 23 infirmiers ont 55 ans et plus (soit 30,4 % de l'effectif).

On recense 7 **pharmacies** sur l'aire en 2004, soit une densité de 3,4 pharmacies pour 10 000 habitants. Cette densité est proche de celles de la Somme (3,5) et de la Picardie (3,3).



Sources : Adeli, OR2S

Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 66,3 % des patients habitant l'aire ayant consulté un médecin généraliste l'ont fait au sein même de l'aire de Moreuil.


En revanche, concernant les autres professionnels de santé tels que ophtalmologue, gynécologue et dermatologue, l'aire étant dépourvue de ces spécialistes, les habitants se tournent principalement vers Amiens (43,7 % des consultations d'ophtalmologues, 77,3 % des visites chez un gynécologue obstétricien, 65,8 % pour les gynécologue médicaux et 59,2 % pour les dermatologues).

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale plus élevée qu'en France métropolitaine

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire de Moreuil est de 72,8 ans pour les hommes et de 82,8 ans pour les femmes. L'espérance de vie des hommes de l'aire est inférieure à celles de la Somme (73,9 ans) et de la région (74,1 ans), contrairement aux femmes qui ont une espérance de vie supérieure (82,8 ans contre 81,6 ans dans la Somme et 81,7 ans en Picardie).

Lorsqu'on compare avec la France métropolitaine (75,9 ans et 83,2 ans), un écart important se marque concernant les hommes : les hommes de Moreuil ont 3,1 ans de moins d'espérance de vie en moyenne.



En 2000-2004, l'aire de Moreuil connaît une **mortalité générale** de 1 062,8 pour 100 000 habitants, soit 192 décès par an. Cette mortalité est assez proche de celles de la Somme (1 055,8) et de la Picardie (1 052,7) mais au-dessus de celle de la France métropolitaine (911,3).

La **mortalité prématurée** (survenant avant 65 ans) est plus forte dans l'aire (290,6 pour 100 000) que dans le département (275,9), qu'en région (262,7) et qu'au niveau national (221,5).

Plus de la moitié des décès survenant dans l'aire de Moreuil en 2000-2004 sont le fait de **tumeurs** et de **maladies de l'appareil circulatoire** (58,5 % des décès masculins et 56,5 % des décès féminins).

Les hommes sont davantage touchés par les tumeurs (33,4 % des décès masculins et 26,2 % des décès féminins) tandis que les femmes sont plus concernées par les maladies de l'appareil circulatoire (30,3 % des décès féminins et 25,1 % des décès masculins).

En troisième position, les causes de mortalité diffèrent selon le sexe. Chez les femmes, ce sont les **maladies de l'appareil respiratoire** qui comptent pour 7,1 % de l'ensemble des décès. Chez les hommes, 10,4 % des décès sont le fait de **causes externes de mortalité** (comprenant les accidents et les suicides).

En troisième position, les causes de mortalité diffèrent selon le sexe. Chez les femmes, ce sont les **maladies de l'appareil respiratoire** qui comptent pour 7,1 % de l'ensemble des décès. Chez les hommes, 10,4 % des décès sont le fait de **causes externes de mortalité** (comprenant les accidents et les suicides).

L'aire de Moreuil affiche un taux de mortalité par **suicide** plus fort que dans la Somme, qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (respectivement 32,4 pour 100 000 contre 26,7, 23,1 et 18,0). Les **accidents de la circulation** engendrent également une mortalité supérieure dans l'aire aux moyennes départementale, régionale et nationale (15,2 pour 100 000 habitants contre respectivement 13,0, 14,3 et 10,8).

En 2004-2005, 5 372 **séjours hospitaliers** par an ont été comptabilisés pour des habitants de l'aire de Moreuil, soit un taux de 269,5 séjours pour 1 000 habitants (contre 273,9 % dans la Somme et 289,3 % en Picardie).

Concernant les **nouvelles admissions en affections de longue durée** (ALD) en 2004-2005, les tumeurs et le diabète sont les deux principales pathologies avancées, pour les femmes comme pour les hommes. À eux deux, ils totalisent près de 40 % des nouvelles admissions.

Le **diabète** induit à terme des affections cardiovasculaires, neurologiques, ophtalmologiques et/ou rénales. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

Le taux d'admissions en ALD pour diabète compliqué dans l'aire (45 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005, soit un taux de 235,2 pour 100 000 habitants) est inférieur à ceux de la Somme (284,7), de la Picardie (311,4) et de la France métropolitaine (266,5).

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	34	24,1	1	48	27,2	1
Diabète	22	15,4	2	23	12,9	2
Affections psychiatriques de longue durée	11	7,9	3	7	3,8	6
Maladie d'Alzheimer et autres démences	9	6,3	4	4	2,4	9
Hypertension artérielle sévère	9	6,3	5	7	3,7	7
Pathologies cardiaques graves	7	5,3	6	13	7,4	4
Accident vasculaire cérébral	7	5,1	7	3	1,9	12
Maladie coronaire	7	4,6	8	18	10,0	3
Insuffisance respiratoire chronique grave	4	3,0	9	7	3,7	8
Artériopathies chroniques graves	4	2,6	10	10	5,8	5
Forme grave des affections neurologiques	2	1,6	12	4	2,3	10
Autres causes de nouvelles admissions	25	17,9	-	33	18,8	-
Total	141	100		176	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Des admissions en ALD faibles pour les pathologies cardiaques graves, la maladie coronaire et l'hypertension artérielle

Les **maladies de l'appareil circulatoire** ont entraîné annuellement, entre 2004 et 2005, 85 nouvelles admissions en affections de longue durée (ALD) se répartissant en 51 admissions pour les hommes et 34 pour les femmes. Ceci représente un taux d'admissions de 448,8 pour 100 000 dans l'aire contre 556,7 dans le département, 602,0 en région et 586,1 au niveau national.

En 2004-2005, 467 séjours hospitaliers en moyenne par an d'habitants de l'aire sont le fait de maladies cardiovasculaires, soit un taux de 24,1 séjours pour 1 000 habitants (26,8 ‰ dans la Somme et 27,8 ‰ en Picardie).

La mortalité de l'aire de Moreuil pour ces pathologies est de 298,5 pour 100 000 en 2000-2004 (53 décès par an), ce qui est moins élevé que dans la Somme (316,6) et qu'en Picardie (314,2) mais plus important qu'en France métropolitaine (271,8).


Les **cardiopathies ischémiques** ont entraîné en 2004-2005, 92 séjours hospitaliers par an d'habitants de l'aire, ce qui représente un taux de 4,7 séjours pour 1 000 habitants (5,4 ‰ dans la Somme et 6,1 ‰ en Picardie).

Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, la mortalité par cardiopathies ischémiques (16 décès annuels) est de 93,6 pour 100 000 dans l'aire et est plus importante que dans le département (87,3), la région (86,6) et le pays (74,6).

Annuellement, entre 2004 et 2005, 10 personnes de l'aire de Moreuil ont bénéficié d'une admission en ALD suite à un **accident vasculaire cérébral** (7 femmes et 3 hommes). Le taux de bénéficiaires de l'ALD dans l'aire (54,2 pour 100 000) est inférieur à ceux du département (55,9), de la région (56,1) et du niveau national (60,5).

En 2004-2005, 38 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an sont liés à des maladies cérébrovasculaires (20 hommes et 18 femmes), soit un taux de séjours de 2,0 pour 1 000. Ce taux est inférieur à ceux de référence : 2,5 ‰ dans le département et 2,8 ‰ en région.

La mortalité par maladies vasculaires cérébrales dans l'aire (12 décès en moyenne par an entre 2000 et 2004, soit un taux de mortalité de 61,2 pour 100 000) est inférieure à celles de la Somme (67,8), de la Picardie (69,6) et de la France métropolitaine (63,4).



Les **pathologies cardiaques graves** ont suscité 20 nouvelles admissions en ALD en moyennes par an entre 2004 et 2005 (13 pour des hommes et 7 pour des femmes).

Cela représente 108,5 admissions en ALD pour 100 000 habitants en 2004-2005, ce qui est moins important que dans les entités géographiques de référence : 145,9 dans la Somme, 149,7 en Picardie et 140,1 en France métropolitaine.

Pour la **maladie coronaire** (127,2 pour 100 000), le taux d'admissions en ALD dans l'aire est également inférieur à ceux de la Somme (142,0), de la Picardie (150,0) et de la France métropolitaine (140,8). Ce sont 25 admissions par an dans l'aire entre 2004 et 2005 (18 hommes et 7 femmes).

La prise en charge en affection de longue durée pour **hypertension artérielle sévère** (HTA) est également plus faible dans l'aire (83,7 pour 100 000) que dans le département (132,0), qu'en région (164,4) et qu'au niveau national (170,2).

On compte annuellement 16 nouveaux admis en ALD pour HTA sévère dans l'aire en 2004-2005 (9 femmes et 7 hommes).

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Des taux d'admissions en ALD faibles mais des mortalités fortes pour les cancers

L'aire de Moreuil a un taux d'admissions en ALD pour **tumeurs malignes** de 434,6 pour 100 000 habitants en 2004-2005 (soit 82 personnes en moyenne par an dont 48 hommes et 34 femmes). Ce taux est moins élevé que ceux de la Somme (489,7), de la Picardie (497,8) et de la France métropolitaine (483,1).

En 2004-2005, 411 séjours hospitaliers pour des habitants de l'aire par an sont liés à des tumeurs (245 hommes et 166 femmes), soit un taux de 20,9 ‰ (22,3 ‰ dans la Somme et 24,3 ‰ en Picardie).


En termes de mortalité, l'aire a un taux de 311,1 pour 100 000 habitants en 2000-2004 (58 décès par an) contre 288,0 dans le département, 286,6 en région et 257,8 au niveau national.



Le **cancer de la prostate** est moins important dans l'aire de Moreuil que dans les entités géographiques de référence avec un taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD à ce titre de 166,9 pour 100 000 en 2004-2005 contre 187,0 dans la Somme, 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine. Après 65 ans, le taux passe à 822,0 pour 100 000 dans l'aire (828,8 dans le département, 969,5 en région et 915,3 au niveau national). Au total, ce sont 14 admissions d'hommes par an en moyenne dans l'aire en 2004-2005, dont 11 hommes âgés de 65 ans et plus.

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer de la prostate est de 3,0 ‰ en 2004-2005 dans l'aire (27 séjours par an), contre 3,6 ‰ dans la Somme et 3,9 ‰ en Picardie.

La mortalité par cancer de la prostate (4 décès annuels) est plus forte dans l'aire de Moreuil (65,4 pour 100 000 en 2000-2004) que dans le département (52,8), qu'en région (53,8) et qu'au niveau national (45,1).




En 2004-2005, 14 femmes de l'aire de Moreuil par an en moyenne (dont 10 de moins de 65 ans) ont bénéficié pour la première fois d'une prise en charge en ALD au titre d'un **cancer du sein**. L'aire présente un taux de bénéficiaires de l'ALD inférieur aux entités géographiques de référence : 143,4 pour 100 000 contre 177,3 dans la Somme, 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine.

Le taux de séjours hospitaliers en 2004-2005 pour cancer du sein est de 3,3 ‰ pour les habitantes de l'aire (34 séjours de femmes en moyenne par an), ce qui est en dessous des taux du département (3,6 ‰) et de la région (4,4 ‰).

Cependant, concernant la mortalité, la tendance s'inverse. Ainsi, la mortalité est de 47,0 pour 100 000 dans l'aire et est plus élevée dans les entités de référence : 39,0 dans la Somme, 37,3 en Picardie et 33,2 en France métropolitaine. Ces cancers représentent 5 décès de femmes de l'aire par an en moyenne entre 2000 et 2004.

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Pour le **cancer colorectal**, on retrouve un taux d'admissions en ALD plus faible dans l'aire que dans les entités géographiques et un taux de mortalité plus fort.

En effet, le cancer colorectal représente par an 7 nouveaux bénéficiaires de l'ALD en 2004-2005 dans l'aire de Moreuil (3 hommes et 4 femmes), soit un taux d'admissions en ALD de 36,4 pour 100 000. Ce taux est inférieur aux entités géographiques de référence : 46,0 dans la Somme, 46,8 en Picardie et 48,4 en France métropolitaine.

Le taux de séjours hospitaliers pour des habitants de l'aire suite à un cancer colorectal est au-dessus des taux du département et de la région : 1,9 ‰ dans l'aire de Moreuil (soit 36 séjours par an entre 2004 et 2005, autant d'hommes que de femmes), contre 2,1 ‰ dans la Somme et 2,3 ‰ en Picardie.

De même, la mortalité par cancer colorectal est plus importante dans l'aire de Moreuil (31,8 pour 100 000 en 2000-2004, soit 6 décès par an) que dans la Somme (30,8), qu'en Picardie (28,9) et qu'en France métropolitaine (27,8).

Pour les **cancers des voies aérodigestives supérieures** (VADS), on dénombre 19 séjours hospitaliers par an d'habitants de l'aire en 2004-2005 (dont 17 concernent des hommes), soit un taux de séjours de 1,0 séjour pour 1 000 habitants (1,4 ‰ dans la Somme et 1,5 ‰ en Picardie).

L'aire a un taux de mortalité plus fort que dans les entités géographiques de référence : 29,7 pour 100 000 dans l'aire de Moreuil en 2000-2004, contre 23,6 dans la Somme, 22,2 en Picardie et 17,3 en France métropolitaine. Il s'agit, sur cette période, de 6 décès en moyenne par an liés à ces cancers dans l'aire.

Les séjours hospitaliers d'habitants de l'aire pour un **cancer de la trachée, des bronches et du poumon** concernent 42 habitants de l'aire par an en 2004-2005 (30 hommes et 12 femmes), soit un taux de 2,1 séjours pour 1 000 habitants (2,5 ‰ dans la Somme et 2,8 ‰ en Picardie).

La mortalité pour ce cancer dans l'aire de Moreuil (11 décès par an en moyenne entre 2000 et 2004) devance les entités géographiques de référence : 57,5 pour 100 000 contre 49,9 dans la Somme, 50,0 en Picardie et 44,0 en France métropolitaine.

7

→ Asthme

En 2006, 1 816 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (932 femmes et 884 hommes) dans l'aire de Moreuil, quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit 12,1 % des assurés de l'aire. Ce taux est supérieur à ceux de la Somme (11,1 %) et de la Picardie (10,3 %). Les femmes sont 11,9 % à avoir reçu ce type de traitement et les hommes, 12,4 %.

Les 0-12 ans sont 14,0 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Moreuil (11,2 % des filles et 16,5 % des garçons), soit 410 jeunes en 2006. Ce taux est également supérieur aux taux du département (12,3 %) et de la région (12,0 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Un faible taux d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer et autres démences



Le taux d'admissions en ALD pour **affection psychiatrique de longue durée** est inférieur dans l'aire de Moreuil (91,5 pour 100 000 personnes, soit 18 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005) à ceux de la Somme (100,2), de la Picardie (131,9) et de la France métropolitaine (169,8).

En 2004-2005, 89 séjours hospitaliers pour troubles mentaux et comportementaux d'habitants de l'aire ont été dénombrés par an, soit un taux de 4,3 séjours pour 1 000 habitants (5,3 ‰ dans la Somme et 7,5 ‰ en Picardie).

Concernant la **maladie d'Alzheimer** et autres démences (13 nouvelles admissions annuelles en 2004-2005, dont 9 femmes), l'aire de Moreuil a également un taux plus faible (72,4) que ceux du département (87,8), de la région (89,5) et du niveau national (86,2).

En 2006, 2,6 % des personnes de 70 ans et plus du régime général ont eu une prescription de **médicaments anti-Alzheimer** dans l'aire de Moreuil, contre 2,8 % dans la Somme et la Picardie.

La proportion de femmes ayant été remboursées est moins élevée que celle des hommes dans l'aire (2,5 % des femmes de 70 ans et plus du régime général contre 2,8 % des hommes de l'aire), contrairement au département et à la région où les femmes ont des pourcentages supérieurs à ceux des hommes (respectivement 3,0 % et 2,3 % dans la Somme et 3,2 % et 2,1 % en Picardie).



En 2006, 27,1 % des assurés sociaux de l'aire ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope** (32,3 % des femmes et 21,0 % des hommes). Cette proportion est plus élevée que celles de la Somme (26,3 %) et de la Picardie (24,1 %) et correspond à 3 795 personnes.

Les psychotropes les plus remboursés sont les **anxiolytiques**. Pour cette classe, la proportion d'assurés de l'aire remboursés au moins une fois en 2006 est de 18,6 % (22,9 % des femmes et 13,6 % des hommes). Cette proportion est proche de celle de la Somme (18,1 %) et plus importante qu'en Picardie (16,4 %).

En tout, 2 625 personnes ont été remboursées pour un anxiolytique en 2006 dans l'aire.

La consommation d'**antidépresseurs** concerne 9,5 % des assurés de l'aire contre 8,8 % dans la Somme et 8,3 % en Picardie (12,4 % des femmes et 6,4 % des hommes, soit 1 358 personnes dans l'aire).

Pour les **neuroleptiques**, la proportion de personnes remboursées au moins une fois en 2006 est de 1,6 % dans l'aire (204 personnes), ce qui est proche des moyennes départementale et régionale (1,7 % dans la Somme et 1,6 % en Picardie).

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de **traitement de la dépendance à l'alcool** concernent moins de 1 % des assurés de l'aire : respectivement 0,2 % (33 personnes), 0,4 % (65 personnes) et 0,5 % (68 personnes).

Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).


→ Prévention

Un taux de dépistage du cancer du sein élevé

Durant la campagne organisée de **dépistage organisé du cancer du sein** de 2005-2006, 1 442 mammographies ont été effectuées dans l'aire de Moreuil, soit une participation de 56,9 % des femmes de 50-74 ans de l'aire.


Cette participation est forte au regard des chiffres enregistrés dans la Somme (52,7 %), en Picardie (45,5 %) et en France entière (47,1 %).

En 2006, 846 **frottis** ont été effectués sur des femmes de 25-64 ans de l'aire de Moreuil. Ceci représente un pourcentage de frottis réalisés de 20,0 %, ce qui est proche de la Somme (20,1 %) et de la Picardie (20,8 %).



Dans l'aire de Moreuil, 17,1 % des femmes ayant accouché ont bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales** en 2000-2003. Ce pourcentage est plus fort que dans la Somme (13,5 %) et qu'en Picardie (15,7 %).

Le pourcentage de **prématurés** en 2000-2003 est par contre plus faible dans l'aire (4,9 %) que dans le département (5,4 %) et qu'en région (5,6 %).



En 2006, 71,7 % des personnes de 65 ans et plus de l'aire de Moreuil sont **vaccinées contre la grippe**. Ce taux est plus élevé que dans la Somme (66,2 %) et qu'en Picardie (64,9 %).

Les femmes de l'aire sont moins vaccinées que les hommes : 68,9 % des femmes de 65 ans et plus contre 76,2 % des hommes.

Cette même année, les personnes en ALD âgées de moins de 65 ans sont 51,0 % à être vaccinées dans l'aire, avec une proportion plus importante chez les femmes cette fois-ci : 59,5 % des femmes contre 46,2 % des hommes en ALD.

Les personnes en ALD de l'aire (51,0 %) sont davantage vaccinées que qu'en Picardie (46,7 %) et autant que dans la Somme (50,8 %).

En 2006, 88,7 % des enfants de 2 ans de l'aire de Moreuil ont été vaccinés contre la **rougeole, les oreillons et la rubéole**, soit plus que la Somme (85,0 %) et presque autant qu'en Picardie (89,2 %).

Le taux de vaccination est de 87,0 % pour la **diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite** dans l'aire. Ce taux est inférieur à ceux de la Somme (89,5 %) et de la Picardie (91,3 %).


Concernant le **BCG**, l'aire a un taux de vaccination de 70,6 % des enfants de 2 ans, ce qui est moins élevé que dans la Somme (77,4 %) et qu'en Picardie (84,6 %).

Enfin, la vaccination contre l'**hépatite B** est plus souvent pratiquée dans l'aire : 54,1 % des enfants de 2 ans en 2006 que dans la Somme (49,6 %) et qu'en Picardie (52,7 %).

Les enfants de 12 ans de l'aire de Moreuil sont 39,3 % à avoir **consulté un dentiste, un chirurgien dentiste et/ou un stomatologue** en 2005-2006. Cette proportion est proche de celle du département (38,8 %) et plus élevée qu'en région (36,9 %).

Ils sont 29,0 % à avoir subi une intervention (30,2 % dans la Somme et 27,4 % en Picardie) : 40 enfants ont eu des soins conservateurs (obturation, détartrage, attelle métallique, scellement prophylactique), 26 des actes de chirurgie et 44 des soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S


Les taux sont inférieurs dans l'aire de Moreuil comparé à ceux de la Picardie concernant le chômage de longue durée et le taux de Rmistes (rapports de 0,9).

Par ailleurs, le revenu moyen y est également moins élevé, de même que le taux d'APA à domicile (rapports respectifs de 0,9 et 0,8).

L'aire est marquée par un taux plus important de bénéficiaires de l'aide ménagère qu'en Picardie (rapport de 1,4) et par une densité de logements sociaux sensiblement plus faible (rapport de 0,4).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

La mortalité liée à l'appareil cardiovasculaire dans l'aire est équivalente à la Picardie mais légèrement au-dessus du niveau de la métropole (rapports respectifs de 1,0 et 1,1).

Le taux d'admissions en ALD pour ces pathologies y est moins important qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (rapports de 0,7 et 0,8).

Concernant les tumeurs malignes, les admissions en ALD sont moins importantes dans l'aire qu'en région et qu'au niveau national (rapports de 0,9), tandis que la mortalité y est plus forte (rapports de 1,1 et 1,2).

De même, le taux d'admissions pour l'ensemble des ALD est moins important dans l'aire qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (rapports de 0,9) tandis que la mortalité générale de l'aire est identique à celle de la région (rapport de 1,0) et supérieure à celle du niveau national (1,2).

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Le taux de dépistage du cancer du sein est supérieur à celui de la Picardie (rapport de 1,3).

De même, la vaccination contre la grippe chez les 65 ans et plus, les consultations chez le dentiste, ainsi que les soins dentaires réalisés par les enfants de 12 ans de l'aire sont plus importants qu'en Picardie (rapports de 1,1 pour les trois indicateurs).

Concernant le pourcentage de frottis réalisés auprès de femmes de 25-64 ans de l'aire et la vaccination ROR des enfants de deux ans, les taux sont équivalents dans l'aire à la région (rapports de 1,0).



→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

L'aire de Moreuil a un indice conjoncturel de fécondité élevé (2,57 enfants par femme) comparé à la Somme (1,82), à la Picardie (2,00) et à la France métropolitaine (1,90). Cette forte fécondité s'accompagne d'une part importante de naissances issues de mères mineures : 11,3 pour 1 000 naissances dans l'aire en 2003-2006 contre respectivement 10,2 ‰, 9,6 ‰ et 5,6 ‰.

Une autre spécificité de l'aire de Moreuil concerne la mortalité liée aux cancers. En effet, parallèlement à des taux d'admissions en ALD au titre d'un cancer du sein (143,4 pour 100 000 en 2004-2005 contre 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine), d'un cancer de la prostate (166,9 contre respectivement 209,5 et 198,0) et d'un cancer colorectal (36,4 contre 46,8 et 48,4) faibles, l'aire de Moreuil présente des taux de mortalités pour ces cancers plus élevés que dans les entités de référence (47,0 pour 100 000 dans l'aire pour le cancer du sein, contre 37,3 en Picardie et 33,2 en France métropolitaine ; 65,4 contre 53,8 et 45,1 pour le cancer de la prostate et 31,8 contre 28,9 et 27,8 pour le cancer colorectal).

Et ce, malgré un taux de dépistage organisé du cancer du sein élevé.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

En 2004-2005, on compte annuellement 318 nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD), soit un taux de 1 675,6 pour 100 000 habitants de l'aire en 2004-2005. Cette proportion est inférieure à celles observées dans le département (1 855,0), en région (1 946,5) et au niveau national (1 877,1).

En 2000-2004, l'espérance de vie à la naissance est de 72,8 ans pour les hommes et de 82,8 ans pour les femmes.

Mortalité générale

En 2000-2004, l'aire de Moreuil connaît une mortalité générale (1 062,8 pour 100 000 habitants) proche de celle de la Picardie (1 052,7) et plus forte qu'en France métropolitaine (911,3).

La mortalité prématurée (survenant avant 65 ans) est plus élevée dans l'aire que dans les entités géographiques de référence : 290,6 pour 100 000 en 2000-2004 dans l'aire contre 275,9 dans la Somme, 262,7 en Picardie et 221,5 en France métropolitaine.

Maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies de l'appareil circulatoire ont entraîné un taux de mortalité moins fort dans l'aire (298,5 pour 100 000) qu'en Picardie (314,2) mais plus élevé qu'en France métropolitaine (271,8). Plus précisément, la mortalité par cardiopathies ischémiques est plus élevée avec un taux de 93,6 pour 100 000 dans l'aire contre 86,6 en région et 74,6 au niveau national en 2000-2004.

Les taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD au titre d'une pathologie cardiaque grave (108,5 pour 100 000 en 2004-2005), d'une maladie coronarienne (127,2) et d'une hypertension artérielle sévère (83,7) sont quant à eux moins élevés qu'en Picardie (149,7, 150,0 et 164,4) et qu'en France métropolitaine (140,1, 140,8 et 170,2).

Cancers

Les tumeurs provoquent une mortalité plus importante dans l'aire (311,1 pour 100 000 en 2000-2004) que dans la région (286,6) et qu'au niveau national (257,8).

Le cancer de la prostate a un taux d'admissions en ALD de 166,9 pour 100 000 en 2004-2005 dans l'aire contre 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine. La mortalité est par contre plus forte dans l'aire (65,4 pour 100 000) qu'en région et qu'au niveau national (respectivement 53,8 et 45,1).

Le cancer colorectal et le cancer du sein ont également des taux d'admissions en ALD plus faibles que la Picardie et que la France métropolitaine mais des mortalités plus fortes. Le cancer colorectal présente un taux d'ALD de 36,4 pour 100 000 (contre 46,8 et 48,4) et une mortalité de 31,8 (contre 28,9 et 27,8). De même, le cancer du sein a un taux d'admissions en ALD de 143,4 pour 100 000 en 2004-2005 (contre 172,6 et 175,3) et une mortalité de 47,0 pour 100 000 en 2000-2004 (contre 37,3 et 33,2).

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

L'aire de Moreuil se caractérise par un taux d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer et autres démences plus faible qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine : 72,4 pour 100 000 habitants, contre respectivement 89,5 et 86,2.

Les assurés du régime général de l'aire de Moreuil sont plus nombreux à avoir eu au moins un remboursement pour un psychotrope que dans la région (27,1 % contre 24,1 %).

Prévention

Dépistages : le taux de dépistage du cancer du sein est plus élevé dans l'aire (56,9 %) qu'en Picardie (45,5 %) tandis que le pourcentage de frottis réalisés y est proche du taux régional (20,0 % contre 20,8 %).

Périnatalité : le pourcentage de femmes ayant eu moins de 7 consultations prénatales est plus important dans l'aire (17,1 %) qu'en Picardie (15,7 %).

Vaccination : les vaccinations anti-grippales chez les 65 ans et plus et chez les personnes en ALD sont plus nombreuses dans l'aire qu'en région. Les vaccinations infantiles sont moins bien suivies qu'en région concernant le ROR, le DTCP et le BCG.

Actes dentaires : les enfants de 12 ans de l'aire de Moreuil ont davantage consulté un dentiste et eu soins dentaires que les enfants picards.

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en février 2009
Il a été rédigé et mis en page par Christophe Pitel, Anne Ducamp,
Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).