

Regard santé

l'aire de Vailly-sur-Aisne

→ Présentation de l'aire

Cette aire ne comprend qu'un **seul canton** éponyme.

Au 1^{er} janvier 2006, ce sont 10 006 habitants qui y sont recensés, soit une densité de 61,7 habitants au km², ce qui est inférieur à l'Aisne (72,9 h/km²), à la Picardie (97,6 h/km²) et à la France métropolitaine (112,9 h/km²).

Cette population compte autant de jeunes de **moins de 25 ans** en 1999 que dans le département et la région (respectivement 33,4 %, 32,3 % et 33,1 %) et davantage qu'au niveau national (30,9 %).

Les **25-59 ans** sont aussi nombreux dans l'aire que dans les entités de référence : 47,2 % contre 46,6 % dans l'Aisne, 47,8 % en Picardie et 47,8 % en France métropolitaine.


Les **75 ans et plus** sont en revanche moins nombreux que dans les entités de référence : 5,7 % contre 7,3 % dans le département, 6,6 % en région et 7,7 % au niveau national.

Entre 2003 et 2006, cette aire présente un **indice conjoncturel de fécondité** de 2,55 enfants par femme. Cet indice est plus élevé que ceux du département (2,09), de la région (1,99) et du niveau national (1,89).

Sur cette période, ce sont 432 naissances qui ont eu lieu et aucune issue de **mères mineures**.

Entre 2001 et 2004, sur les 454 naissances dont la mère habite l'aire de Vailly-sur-Aisne, 77,9 % ont eu lieu à Soissons, 12,3 % à Laon, 7,7 % à Reims et 2,2 % ailleurs en France.

De même, les 643 décès domiciliés dans l'aire survenus durant cette période ont été constatés à 63,3 % à Soissons, 17,9 % à Reims, 11,4 % à Laon et 7,5 % ailleurs en France.



Source : Insee, recensement de la population 1999

SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



Assurance
Maladie

Service Médical
Nord-Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales


Moins d'allocataires de la CMU et du RMI qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine

Moins de la moitié des foyers de l'aire de Vailly-sur-Aisne est **non imposable** (48,9 %), ce qui est inférieur à l'Aisne (52,4 %) mais plus élevé qu'en Picardie (47,8 %) et qu'en France métropolitaine (46,2 %).

Le revenu moyen des habitants de l'aire est de 16 223 € en 2005, soit un revenu supérieur au département (14 681 €) et à la région (15 938 €) mais inférieur à la moyenne nationale (17 165 €).

Le taux de bénéficiaires de l'**aide ménagère** est de 15,7 pour 1 000 personnes de 65 ans et plus dans l'aire de Vailly-sur-Aisne en 2004. Cette proportion est inférieure au département (22,7 ‰) et à la région (21,3 ‰).

De même, le nombre de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA) à domicile est moindre dans l'aire (125,9 ‰) que dans l'Aisne (129,6 ‰) et qu'en France métropolitaine (149,4 ‰), mais dépasse la proportion d'allocataires relevée en Picardie (117,7 ‰).



En 2004, l'aire compte 440 **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) de catégorie 1, dont 50,2 % sont des hommes. Ce pourcentage est inférieur à ceux du département (53,2 %) et de la région (51,9 %).

Les DEFM de moins de 25 ans sont également moins nombreux que dans l'Aisne et qu'en Picardie : 20,0 % contre 25,4 % et 24,8 %.

En revanche, les DEFM de 25-49 ans (61,6 %) et les 50 ans et plus (18,4 %) sont plus nombreux que dans les entités géographiques de référence : respectivement 60,4 % et 14,2 % dans le département, et 61,6 % et 13,6 % en région.


Enfin, les DEFM de plus d'un an d'ancienneté sont aussi nombreux dans l'aire (38,9 %) que dans le département (38,5 %) et plus qu'en région (33,9 %).

L'aire compte deux fois moins d'allocataires du **revenu minimum d'insertion** (19,8 ‰) que l'Aisne (42,3 ‰), que la Picardie (42,3 ‰) et que la France métropolitaine (41,9 ‰).

De même, les allocataires du RMI pour les familles monoparentales et les couples sont sensiblement moins nombreux dans l'aire (55,6 pour 1 000 familles monoparentales et 5,4 pour 1 000 couples) que dans le département (140,2 ‰ et 15,8 ‰) et qu'en région (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

C'est aussi le cas pour les Rmistes de 25-49 ans : 16,9 ‰ dans l'aire contre 35,6 ‰ dans l'Aisne et 33,4 ‰ en Picardie.

2



Les bénéficiaires de la **couverture maladie universelle (CMU) de base** représentent un effectif moins important dans l'aire (4,6 ‰) que ceux de l'Aisne (10,7 ‰), de la Picardie (16,1 ‰) et de la France métropolitaine (22,1 ‰).

Même observation pour la **CMU complémentaire** : 40,8 ‰ personnes affiliées dans l'aire contre 100,7 ‰ dans le département, 89,6 ‰ en région et 67,5 ‰ au niveau national.

→ Professionnels de santé

Une densité de généralistes plus faible qu'en région et qu'au niveau national


En novembre 2006, l'aire de Vailly-sur-Aisne compte 8 **médecins généralistes**, soit une densité de 7,8 généralistes pour 10 000 habitants. Cette densité est inférieure à celles de l'Aisne (8,9), de la Picardie (9,7) et de la France métropolitaine (11,2).

Leur âge moyen est de 53,1 ans, ce qui est plus âgé que leurs confrères du département (51,1 ans), de la région (49,4 ans) et du niveau national (49,8 ans).

Cinq médecins ont par ailleurs 55 ans ou plus, ce qui est plus important que dans les entités géographiques de référence : 62,5 % dans l'aire contre 35,1 % dans l'Aisne, 31,5 % en Picardie et 32,3 % en France métropolitaine.

Deux femmes comptent parmi l'effectif, soit 25,0 % (22,1 % dans l'Aisne, 27,6 % en Picardie et 29,4 % en France métropolitaine).

L'aire de Vailly-sur-Aisne ne compte aucun **spécialiste** en novembre 2006.



Sources : Adeli, Insee, OR2S

Au 31 décembre 2007, 5 **chirurgiens-dentistes** (dont 3 femmes) sont installés dans cette aire, ce qui équivaut à une densité de 4,9 pour 10 000 habitants (4,3 dans le département, 4,0 en région et 6,2 au niveau national).

Ils ont en moyenne 44,2 ans et un seul a 55 ans ou plus. Ils sont plus jeunes que les dentistes Axonais (47,2 ans), Picards (48,2 ans) et Français (47,8 ans).

L'aire compte 13 **auxiliaires médicaux** en avril 2007, soit une densité de 12,7 pour 10 000 habitants. Cette densité est inférieure à celles de l'Aisne (14,7), de la Picardie (13,8) et de la France métropolitaine (21,9).

Leur moyenne d'âge se situe à 47,1 ans, soit une moyenne supérieure au département (43,7 ans), à la région (43,5 ans) et au niveau national (43,6 ans). Huit de ces auxiliaires sont des femmes et deux ont 55 ans ou plus.


Onze **infirmiers** libéraux et mixtes sont installés dans l'aire en avril 2007, soit une densité de 10,8 pour 10 000 habitants. Cette densité est plus importante que dans l'Aisne (8,7) et qu'en Picardie (7,1) et proche de celle de la France métropolitaine (11,2).

Leur moyenne d'âge (46,4 ans) est située au-dessus de celles des trois zones géographiques de référence (entre 44 ans et 45 ans). Deux des ces infirmiers ont 55 ans ou plus.

L'aire compte 8 femmes parmi ses infirmiers, soit 72,7 % de l'effectif. Cette proportion est moins importante que dans le département (89,2 %), qu'en région (88,5 %) et qu'au niveau national (84,6 %).

L'aire de Vailly-sur-Aisne comprend 2 **pharmacies** en 2004, soit une densité de 2,0 pour 10 000 habitants. Cette densité est inférieure à celles de l'Aisne (3,5) et de la Picardie (3,3).

3



Sources : Adeli, OR2S

Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 40,4 % des habitants de l'aire ayant consulté un médecin généraliste l'ont fait dans l'aire de Vailly-sur-Aisne. Soissons a regroupé 27,5 % des consultations et Anizy-le-Château, 12,8 %.


En revanche, pour ce qui est des consultations chez le spécialiste, c'est Soissons qui est majoritaire : 87,4 % des consultations chez l'ophtalmologue ; 92,3 % des consultations en gynécologie médicale ; 78,8 % des consultations chez le dermatologue (Laon en recevant 11,2 %). En gynécologie-obstétrique, les patients se dirigent à 44,7 % sur Soissons tandis que Reims regroupe 21,1 % des consultations et Laon, 17,8 %.

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale plus élevée qu'en France métropolitaine mais plus faible qu'en Picardie

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire de Vailly-sur-Aisne est de 73,0 ans pour les hommes. Cette espérance de vie est équivalente à celle du département (73,3 ans) mais inférieure de 1,1 an à celle de la région (74,1 ans) et de 2,9 ans à la moyenne nationale (75,9 ans).

En revanche, l'espérance de vie des femmes est supérieure dans l'aire (83,5 ans) aux moyennes de l'Aisne (81,4 ans) et de la Picardie (81,7 ans) et équivalente à la France métropolitaine (83,2 ans).



Concernant la **mortalité générale**, elle s'élève à 984,9 décès pour 100 000 habitants dans l'aire en 2000-2004 (80 décès annuels moyens, dont 49 hommes), ce qui est moins important que dans le département (1 098,1) et qu'en région (1 052,7) mais plus élevé qu'au niveau national (911,3).

La **mortalité prématurée** a un taux inférieur dans l'aire (267,2) au département (277,8), équivalent à la Picardie (262,7) et supérieur à la France métropolitaine (221,5). Ceci représente 22 décès annuels moyens dans l'aire en 2000-2004, dont 18 hommes.

La majorité des décès survenant dans l'aire sont le fait de tumeurs et de maladies de l'appareil circulatoire. Elles représentent respectivement 30,1 % et 28,8 % des décès de Vailly-sur-Aisne en 2000-2004.

Les **tumeurs** occasionnent le plus de décès chez les hommes (34,3 %) devant les maladies de l'appareil circulatoire (23,7 %) et les causes externes de mortalité (accidents, traumatismes...) (12,2 %).

En revanche, pour les femmes, ce sont les maladies de l'**appareil circulatoire** qui représentent la première cause de mortalité avec 37,0 % des décès, devant les tumeurs (23,4 %) et les **causes externes** de mortalité, *ex-aequo* avec les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (6,5 % des décès féminins chacun).

L'aire de Vailly-sur-Aisne présente un taux de mortalité par **suicide** (21,8 pour 100 000) inférieur à ceux de l'Aisne et de la Picardie (22,8 et 23,1) mais supérieur à celui de la France métropolitaine (18,0).

La mortalité due aux **accidents de la circulation** est plus élevée dans l'aire (26,0) que dans les trois entités géographiques de référence (respectivement 15,2, 14,3 et 10,8).

Le taux de **séjours hospitaliers** est de 251,8 pour 1 000 habitants dans l'aire de Vailly-sur-Aisne, soit 2 384 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an (1 154 hommes et 1 230 femmes). Ce taux est inférieur à ceux de l'Aisne (291,5 ‰) et de la Picardie (289,3 ‰).

Concernant les nouvelles **admissions en affections de longue durée** en 2004-2005, les tumeurs et le diabète sont les deux principaux motifs d'admissions. À eux deux, ils totalisent 46,1 % des nouvelles admissions de l'aire.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires d'une ALD pour **diabète** est de 34 personnes en moyenne par an dans l'aire, soit un taux de 298,7 pour 100 000 en 2004-2005, ce qui est plus faible que dans l'Aisne (345,7) et qu'en Picardie (311,4) et plus élevé qu'en France métropolitaine (266,5).

Le diabète fait partie des maladies qui induisent à terme des complications telles que des pathologies cardio-vasculaires, rénales, neurologiques ou ophtalmologiques. Une étude met en évidence une non prise en charge d'un cas sur quatre.

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	16	23,2	1	28	27,8	1
Diabète	14	21,2	2	19	19,5	2
Affections psychiatriques de longue durée	6	8,2	3	7	7,0	4
Pathologies cardiaques graves	5	7,3	4	6	5,6	5
Hypertension artérielle sévère	4	6,6	5	5	4,8	6
Maladie coronaire	4	6,6	6	12	12,2	3
Accident vasculaire cérébral	3	3,9	7	3	3,1	9
Maladie d'Alzheimer et autres démences	2	3,6	8	2	2,1	10
Artériopathies chroniques	2	3,5	9	4	4,0	7
Polyarthrite rhumatoïde évolutive	2	2,5	10	1	0,6	14
Insuffisance respiratoire chronique	1	1,0	15	4	4,0	8
Autres causes de nouvelles admissions	8	12,4	-	9	9,2	-
Total	68	100		100	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Des taux d'admissions en ALD pour AVC élevés mais un taux de mortalité faible

Les **maladies de l'appareil circulatoire** ont engendré 49 nouvelles admissions en ALD en moyenne par an en 2004-2005, dont 30 hommes. Cela représente un taux de 546,3 pour 100 000 dans l'aire contre 605,1 dans l'Aisne, 602,0 en Picardie et 586,1 en France métropolitaine.

On dénombre 245 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an en 2004-2005 pour ces pathologies, soit un taux de 26,5 séjours pour 1 000 habitants. Ceci est inférieur à ceux de l'Aisne (29,7 ‰) et de la Picardie (27,8 ‰).

Le taux de mortalité est de 300,4 pour 100 000 dans l'aire en 2000-2004, ce qui est moins élevé que dans l'Aisne (331,5) et qu'en Picardie (314,2) mais plus fort que le taux de la France métropolitaine (271,8). Annuellement, 23 personnes de l'aire sont décédées du fait de ces pathologies (12 hommes et 11 femmes).


En 2004-2005, 67 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an sont dus à des **cardiopathies ischémiques** (47 pour des hommes), soit un taux de 7,0 séjours pour 1 000 habitants contre 6,8 ‰ dans le département et 6,1 ‰ en région.

Cette pathologie est responsable d'un taux de mortalité de 81,8 pour 100 000 dans l'aire en 2000-2004. Ce taux est inférieur à ceux de l'Aisne (90,8) et de la Picardie (86,6) et dépasse celui de la France métropolitaine (74,6). Le nombre de décès correspondant est de 7 par an en moyenne d'habitants de l'aire, dont 4 hommes.

Les **accidents vasculaires cérébraux** (AVC) sont responsables de 6 nouvelles admissions en ALD par an dans l'aire (autant d'hommes que de femmes). Le taux d'admissions correspondant est de 66,1 pour 100 000, ce qui est supérieur aux taux relevés dans les entités géographiques de référence : 55,0 dans l'Aisne, 56,1 en Picardie et 60,5 en France métropolitaine.

En 2004-2005, 25 séjours pour AVC d'habitants de l'aire ont été recensés en moyenne par an (dont 15 pour des hommes), soit un taux de 2,9 ‰ (2,5 ‰ dans l'Aisne et 2,6 ‰ en Picardie).

En 2000-2004, 5 décès d'habitants de l'aire par an sont dus à cette pathologie (3 hommes et 2 femmes), soit un taux de mortalité par AVC de 58,7 pour 100 000. Ce taux est moins élevé que dans l'Aisne (74,0), qu'en Picardie (69,6) et qu'en France métropolitaine (63,4).



Les **pathologies cardiaques graves** ont engendré 11 nouvelles admissions annuelles en 2004-2005 (dont 6 pour des hommes), soit un taux de 124,1 pour 100 000 habitants. Ce taux est inférieur aux taux départemental (150,4), régional (149,7) et national (140,1).

Les admissions en ALD pour la **maladie coronaire** concernent 16 habitants de l'aire en moyenne par an en 2004-2005 (4 femmes, 12 hommes), soit un taux de 180,6 pour 100 000. Ce taux est plus élevé que dans le département (161,8), qu'en région (150,0) et qu'au niveau national (140,8).

Le taux d'admissions pour **hypertension artérielle sévère** est de 104,4 pour 100 000 dans l'aire en 2004-2005 (5 hommes et 4 femmes en moyenne par an), ce qui est inférieur aux taux de l'Aisne (149,0), de la Picardie (164,4) et de la France métropolitaine (170,2).

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Des taux d'admissions en ALD et de mortalité faibles pour le cancer du sein

En 2004-2005, l'aire de Vailly-sur-Aisne a un taux d'admissions en ALD pour **tumeurs malignes** de 468,2 pour 100 000 (43 admissions annuelles dont 28 hommes), soit moins que dans l'Aisne (525,4), qu'en Picardie (497,8) et qu'en France métropolitaine (483,1).

Le taux de séjours hospitaliers pour tumeurs est de 19,4 ‰ dans l'aire en 2004-2005 (186 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an, dont 112 hommes) contre 23,0 ‰ dans le département et 24,3 ‰ en région.


Le taux de mortalité est inférieur au département et à la région (271,8 contre 295,9 et 286,6) mais dépasse le niveau national (257,8). Cela représente 24 décès dans l'aire par an entre 2000 et 2004, dont 17 chez des hommes.



Le **cancer de la prostate** est responsable de 10 admissions annuelles en ALD dans l'aire, dont 8 pour des hommes de 65 ans ou plus. Le taux d'admissions de l'aire est de 248,6 pour 100 000 en 2004-2005, ce qui est proche de l'Aisne (240,7), mais plus élevé qu'en Picardie (209,5) et qu'en France métropolitaine (198,0). La tendance est la même pour les hommes de 65 ans ou plus : 1 185,5 contre respectivement 1 122,9, 969,5 et 915,3.

En 2004-2005, 15 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire sont recensés pour ce cancer en moyenne par an. Le taux est de 3,5 séjours pour 1 000 habitants contre 4,3 ‰ dans l'Aisne et 3,9 ‰ en Picardie.

Ce cancer a engendré en 2000-2004, 2 décès en moyenne par an dans l'aire. Le taux de mortalité correspondant est de 59,0 pour 100 000 hommes, soit un taux équivalent à celui du département (59,2) mais supérieur à ceux de la région (53,8) et du niveau national (45,1).




En 2004-2005, ce sont annuellement 6 femmes (dont 3 de moins de 65 ans) qui ont été admises en ALD pour un **cancer du sein** dans l'aire. Le taux d'admissions en ALD est de 116,2 pour 100 000 femmes, ce qui est inférieur à ceux de l'Aisne (171,4), de la Picardie (172,6) et de la France métropolitaine (175,3).

On dénombre 21 séjours hospitaliers d'habitantes de l'aire pour ce cancer en moyenne par an en 2004-2005, soit un taux de 4,0 séjours pour 1 000 habitantes contre 4,4 ‰ dans l'Aisne et en Picardie.

Le taux de mortalité dans l'aire est inférieur aux entités géographiques de référence : 19,3 pour 100 000 (1 décès en moyenne par an en 2000-2004) contre 36,5 dans le département, 37,3 en région et 33,2 au niveau national.

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Le **cancer du côlon-rectum** a engendré un taux d'admissions en ALD de 44,8 pour 100 000 dans l'aire en 2004-2005 (4 admissions en moyenne par an). Ce taux est inférieur à ceux relevés dans le département (48,7), en région (46,8) et au niveau national (48,4).

En 2004-2005, 16 séjours à l'hôpital d'habitants de l'aire par an sont dus à cette pathologie, soit 1,6 séjour pour 1 000 habitants (2,3 ‰ dans l'Aisne et en Picardie).

Le taux de mortalité pour cancer colorectal est de 41,5 pour 100 000 dans l'aire en 2000-2004 (3 décès, dont 2 hommes), soit un taux supérieur aux zones géographiques de référence : respectivement 30,1, 28,9 et 27,8.

On dénombre 9 séjours hospitaliers en moyenne par an d'habitants de l'aire (dont 8 pour des hommes) pour un **cancer des voies aériennes supérieures (VADS)** en 2004-2005, soit un taux de 0,9 séjour pour 1 000 habitants. Ce taux est inférieur à ceux du département (1,4 ‰) et de la région (1,5 ‰).

Ce cancer présente un taux de mortalité inférieur à ceux de l'Aisne, de la Picardie et de la France métropolitaine : 16,4 pour 100 000 contre respectivement 23,5, 22,2 et 17,3. Ce taux correspond à 2 décès dans l'aire en moyenne par an entre 2000 et 2004, également répartis entre hommes et femmes.

Le taux de séjours hospitaliers de l'aire de Vailly-sur-Aisne pour **cancer de la trachée, des bronches et du poumon** est de 1,3 ‰ en 2004-2005, ce qui est moins élevé que dans le département (2,5 ‰) et qu'en région (2,8 ‰). Par an, cela représente 13 admissions en ALD en moyenne d'habitants de l'aire (11 hommes et 2 femmes).

La mortalité pour ce cancer dans l'aire s'élève à 40,3 pour 100 000 habitants en 2000-2004, ce qui est là aussi inférieur aux taux de l'Aisne (51,8), de la Picardie (50,0) et de la France métropolitaine (44,0). En 2000-2004, ce sont 4 personnes de l'aire en moyenne par an qui sont décédées de ces pathologies (dont 3 hommes).

→ Asthme

En 2006, 756 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (358 femmes et 398 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **9,7 % des assurés** de l'aire de Vailly-sur-Aisne. Ce taux est proche de ceux de l'Aisne (10,8 %) et de la Picardie (10,3 %). Le taux féminin est inférieur au masculin dans l'aire : 9,0 % des femmes et 10,8 % des hommes.

Les 0-12 ans sont 13,5 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Vailly-sur-Aisne, soit 187 jeunes en 2006. Ce taux est supérieur aux taux départemental (12,6 %) et régional (12,0 %). Les filles de l'aire sont moins concernées que les garçons : 8,5 % des filles (10,3 % dans l'Aisne et 10,1 % en Picardie) contre 18,0 % des garçons (14,8 % et 13,9 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.


→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Un faible taux d'admissions en ALD pour maladie d'Alzheimer et autres démences


L'aire de Vailly-sur-Aisne compte 13 admissions annuelles en ALD (7 hommes et 6 femmes) pour **affection psychiatrique de longue durée**, soit un taux de 134,8 pour 100 000 en 2004-2005. Ce taux est moins élevé que dans l'Aisne (155,6) et qu'en France métropolitaine (169,8) et proche de la Picardie (131,9).

En 2004-2005, 35 séjours d'habitants de l'aire (18 hommes et 17 femmes) sont recensés en moyenne par an pour **troubles mentaux et comportementaux**, soit 3,4 séjours pour 1 000 habitants. Ce taux est sensiblement inférieur à ceux de l'Aisne (6,4 ‰) et de la Picardie (7,5 ‰).

Le taux d'admissions en ALD pour **maladie d'Alzheimer** et autres démences est de 57,9 pour 100 000 dans l'aire en 2004-2005 (5 admissions en moyenne par an), soit moins que dans le département (89,0), qu'en région (89,5) et qu'au niveau national (86,2).



En 2006, 11 personnes de 70 ans et plus du régime général ont été **traitées par un médicament anti-Alzheimer**, soit 1,4 % de la population. Ce taux est sensiblement inférieur à ceux du département (3,2 ‰) et de la région (2,8 ‰). Les hommes sont, dans cette aire, davantage traités que les femmes : 2,0 % des hommes (2,3 % dans l'Aisne et 2,1 % en Picardie) contre 1,1 % des femmes (3,6 % dans l'Aisne et 3,2 % en Picardie).



En 2006, 20,7 % des assurés sociaux du régime général ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope** (1 536 personnes, 25,2 % des femmes et 15,6 % des hommes). Cette proportion est inférieure à celles relevées dans l'Aisne (24,7 ‰) et en Picardie (24,1 ‰).

Les psychotropes les plus remboursés sont les **anxiolytiques**. La proportion d'assurés remboursés au moins une fois pour un anxiolytique en 2006 est de 13,5 % dans l'aire (999 personnes, 16,8 % des femmes et 9,6 % des hommes), ce qui est moins élevé que dans le département (16,6 ‰) et qu'en région (16,4 ‰).

La consommation d'**antidépresseurs** concerne 566 personnes dans l'aire en 2006, soit 7,5 % des assurés de l'aire (9,8 % des femmes et 4,8 % des hommes). Cette proportion est une nouvelle fois moins importante dans l'aire que dans l'Aisne (8,6 ‰) et qu'en Picardie (8,3 ‰).

En 2006, 92 assurés sociaux de l'aire ont été remboursés au moins une fois pour un **neuroleptique**, soit une proportion de 1,3 ‰ (1,9 ‰ dans le département et 1,6 ‰ en région). Cela représentait 1,4 % des femmes et 1,0 % des hommes.

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de **traitement de dépendance à l'alcool** concernent moins de 1 ‰ des assurés sociaux de l'aire : respectivement 0,1 ‰ (10 personnes), 0,3 ‰ (22 personnes) et 0,3 ‰ (24 personnes).


Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).

→ Prévention

Un taux de dépistage organisé du cancer du sein plus faible dans l'aire qu'en région


Durant la campagne de dépistage organisé du **cancer du sein** de 2005-2006, 566 mammographies ont été réalisées sur des femmes de 50-74 ans de l'aire de Vailly-sur-Aisne, soit une participation de 42,9 %. Cette participation est meilleure que celle de l'Aisne (40,6 %) mais moins bonne qu'en Picardie (45,5 %) et qu'en France entière (47,1 %).

En 2006, ce sont 286 femmes de 25-64 ans de l'aire qui ont bénéficié d'un **frottis**, soit un taux de participation de 13,5 %. Ce taux est inférieur à ceux de l'Aisne (16,4 %) et de la Picardie (20,8 %).



En 2000-2003, 27,5 % des femmes de l'aire ayant accouché n'ont bénéficié de moins de **7 consultations prénatales**, ce qui est plus important que dans l'Aisne (21,5 %) et qu'en Picardie (15,7 %).

La proportion de **prématurés** dans l'aire (6,3 %) est proche de celles relevées dans le département (6,1 %) et en région (5,6 %).



En 2006, 70,0 % des personnes du régime général âgées de 65 ans ou plus de l'aire ont été **vaccinées contre la grippe**, soit plus que dans l'Aisne (67,0 %) et qu'en Picardie (64,9 %). Ce taux représente 701 personnes, les hommes étant davantage vaccinés que les femmes : 72,0 % des hommes (68,9 % dans le département et 66,1 % en région) contre 68,6 % des femmes (respectivement 65,9 % et 64,2 %).

Concernant les personnes de moins de 65 ans inscrites en affection de longue durée, le taux de couverture vaccinale pour la grippe est également meilleur dans l'aire (66,7 %) que dans le département et qu'en région (51,3 % et 46,7 %). Les hommes sont également plus souvent vaccinés que les femmes : 70,3 % (50,9 % dans l'Aisne et 46,1 % en Picardie) contre 61,3 % des femmes (respectivement 52,2 % et 47,6 %).

En 2006, 92,0 % des enfants de deux ans de l'aire ont été vaccinés contre **la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)**, soit plus que dans l'Aisne (91,3 %) et qu'en Picardie (89,2 %).

On recense 96,0 % des enfants de deux ans vaccinés contre **la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite**. Cette proportion est supérieure au département (92,9 %) et à la région (91,3 %).


Concernant le **BCG**, 82,7 % des enfants sont vaccinés, ce qui est moins important que dans l'Aisne (88,5 %) et qu'en Picardie (84,6 %).

Enfin, la vaccination contre l'**hépatite B** n'est réalisée que chez 49,3 % des enfants de deux ans de l'aire, soit moins que dans le département (58,2 %) et qu'en région (52,7 %).

Sur les 138 enfants de 12 ans habitant l'aire de Vailly-sur-Aisne et affiliés au régime général, 44,2 % ont bénéficié d'une **consultation chez un dentiste, un chirurgien-dentiste et/ou un stomatologue** l'année de leur 12 ans (enfants nés entre le 1^{er} août 1993 et le 31 juillet 1994), soit une proportion supérieure à celles de l'Aisne (41,2 %) et de la Picardie (36,9 %).

Parmi eux, 31,2 % ont subi une intervention contre 30,0 % dans le département et 27,4 % en région : 27 ont eu des soins conservateurs, 17 de la chirurgie et 35 des soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S


L'aire de Vailly-sur-Aisne présente des indicateurs socio-économiques légèrement plus favorables que la Picardie avec un revenu annuel moyen supérieur au revenu moyen picard.

Par ailleurs, l'aire compte moins d'allocataires du RMI que la région. En revanche, les chômeurs de longue durée sont plus nombreux que la moyenne régionale (rapport de 1,1) alors que la densité de logements sociaux est très nettement inférieure à celle retrouvée en région (rapport de 0,3).

D'autre part, le nombre de bénéficiaires de l'aide ménagère y est moins important qu'en Picardie alors que l'aire compte légèrement plus de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Par rapport à la Picardie, l'aire présente des taux de mortalité et d'admissions en ALD plus faibles.

L'aire présente des taux de mortalités plus élevés qu'au niveau national (mortalité générale, par tumeurs et par maladies de l'appareil circulatoire) tandis que son taux d'admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires est plus faible. Les taux d'admissions en ALD pour tumeurs et l'ensemble des ALD sont de niveau équivalents à la France métropolitaine.

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Le taux de dépistage organisé du cancer de sein est moins bon dans l'aire qu'en Picardie (rapport de 0,9), de même que le pourcentage de frottis réalisés est très inférieur à la moyenne régionale (rapport de 0,6).

Concernant les vaccinations infantiles, le ROR a une meilleure couverture vaccinale dans l'aire qu'en région.

Les enfants de l'aire ont davantage consulté un dentiste que le reste de la Picardie et ont plus bénéficié de soins dentaires.



→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

Alors que l'espérance de vie des hommes de l'aire est inférieure à celles de la région et du niveau nationale, celle des femmes est supérieure à celle de la Picardie et équivalente à la France métropolitaine.

Le niveau socio-économique de l'aire est supérieur à celui de la région sur quelques indicateurs (revenu plus important, moins d'allocataires de la CMU et du RMI). Le taux de mortalité générale est d'ailleurs inférieur à celui de la région et ne dépasse que de peu le niveau national (984,9 pour 100 000 contre 1 052,7 en Picardie et 911,3 en France métropolitaine).

Concernant les pathologies, les accidents vasculaires cérébraux entraînent un taux d'admissions en ALD plus important dans l'aire que dans les entités de référence parallèlement à une mortalité plus faible. Le cancer du sein a également un taux de mortalité plus faible dans l'aire, mais également un taux d'admissions en ALD moins élevé qu'en région et qu'au niveau national.

Par ailleurs, la maladie d'Alzheimer a un taux d'admissions en ALD sensiblement plus faible dans l'aire qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

L'aire de Vailly-sur-Aisne compte 167 nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée en moyenne par an en 2004-2005, soit un taux de 1 821,4 pour 100 000 habitants. Ce taux est inférieur aux taux relevés dans le département (2 039,0), en région (1 946,5) et au niveau national (1 877,1).

L'espérance de vie à la naissance est de 73,0 ans pour les hommes et 83,5 ans pour les femmes.

Mortalité générale

Si les mortalités générale (984,9) et prématurée (267,2) de l'aire sont supérieures aux taux nationaux (911,3 et 221,5), elles sont en revanche plus faibles ou voisines des taux régionaux (respectivement 1 052,7 et 262,7).

Maladies de l'appareil circulatoire

La mortalité par maladies cardiovasculaires est inférieure dans l'aire (300,4) au niveau régional (314,2) mais supérieure à la moyenne nationale (271,8). Le taux de mortalité pour cardiopathies ischémiques est également plus élevé dans l'aire (81,8) qu'en France métropolitaine (74,6).

En outre, si le taux d'admissions en ALD pour accidents vasculaires cérébraux (AVC) est élevé dans l'aire (66,1 contre 60,5 en France métropolitaine), la mortalité pour cette pathologie apparaît inférieure au niveau national (58,7 *versus* 63,4).

Les taux d'admissions en ALD pour pathologies cardiaques graves et hypertension artérielle sévère sont inférieurs dans l'aire aux entités géographiques de référence, tandis que le taux d'admissions pour la maladie coronaire est plus élevé.

Cancers

Le taux d'admissions en ALD pour tumeurs malignes est plus faible dans l'aire (468,2) qu'en région (497,8) et qu'au niveau national (483,1). Si le taux de mortalité dans l'aire (271,8) est inférieur à celui de la Picardie (286,6), il demeure plus élevé qu'en France métropolitaine (257,8).

Les taux d'admissions en ALD et de mortalité concernant le cancer de la prostate sont supérieurs dans l'aire aux valeurs régionales et nationales. En revanche, la tendance est inverse quant au cancer du sein qui présente moins d'admissions en ALD et une mortalité plus faible dans l'aire.

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Le taux de séjours hospitaliers pour troubles mentaux et comportementaux est sensiblement plus faible pour des habitants de l'aire qu'aux niveaux départemental et régional (respectivement 3,4 ‰ contre 6,4 ‰ et 7,5 ‰).

On dénombre moins d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer et autres démences dans l'aire de Vailly-sur-Aisne (57,9) qu'en région (89,5) et qu'au niveau national (86,2).

Prévention

Dépistages : concernant le dépistage organisé du cancer du sein, le taux de participation dans l'aire (42,9 %) est meilleur que dans le département (40,6 %) mais n'atteint pas les moyennes régionale (45,5 %) et nationale (47,1 %). De même, le pourcentage de frottis réalisés est faible dans l'aire par rapport à la Picardie (13,5 % contre 20,8 %).

Périnatalité : les femmes de l'aire ont eu plus souvent moins de 7 consultations prénatales que dans le département ou qu'en région (27,5 % contre 21,5 % et 15,7 %).

Vaccination : la couverture vaccinale des enfants de deux ans concernant le ROR et le DTCP est meilleure dans l'aire qu'en région tandis que l'hépatite B et le BCG ont des taux de vaccination moins importants qu'en Picardie.

La vaccination contre la grippe est meilleure dans l'aire qu'en Picardie tant pour les personnes de 65 ans ou plus que pour celles inscrites en affection de longue durée et âgées de moins de 65 ans.

Actes dentaires : les enfants de 12 ans de l'aire ont davantage consulté un dentiste que dans l'ensemble du département et de la région (44,2 % *versus* 41,2 % et 36,9 %).

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en juillet 2009
Il a été rédigé et mis en page par Emilie Pluquet, Anne Ducamp,
Alexandra Fourquier, Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).